

昭和參年
度

農林省
指
定 水稻新品種育成試驗成績

岐阜縣立農事試驗場

昭和參年度 稲新品種育成試驗成績目次

(一) 耕種梗概並二歲植標準

一頁

(二) 試驗操作

一頁

(三) 試驗經過、一般概要

一頁

(4) 標準栽培二代凡雜種第四代以後ノ系統育成試驗

二頁

(5) 多肥栽培二代凡雜種第四代以後ノ系統育成試驗

五頁

(6) 多肥栽培二代凡未固定系統生產力檢定試驗

六三頁

(7) 多肥栽培二代凡未固定系統生產力檢定試驗

八五頁

(8) 耐病性交配用品種選定試驗

一七頁

成績表

(1) 標準栽培二代凡雜種第四代以後ノ系統育成試驗成績表

八頁

(2) 多肥栽培二代凡雜種第四代以後ノ系統育成試驗成績表

二八頁

(3) 標準栽培二代凡未固定系統生產力檢定試驗成績表

四八頁

(4) 多肥栽培二代凡未固定系統生產力檢定試驗成績表

五六頁

(5) 耐病性交配用品種選定試驗成績表

七八頁

昭和三年度稻新品種育成試驗成績

(一) 群植種並ニ栽植標準

昭和三年度設計書、通り實施せり

(二) 試験操作

本省指定水稲新品種育成試験ニ因スル試験方法ニ津據シテ行ヘ
ドモ、ト多シ異ナレル操作ヲ行ヒタル試験ハ該試験ノ項ニ其異ナリ
タル事ヲ記載スルコト、セリ

(三) 試験経過、一般概要

本年度ハ區劃整理、蘇後ニシテ比較的の地力不均ナル所多シ、螟蟲ニ
依ル被害輕少ナレドモ八月中旬以後、於ケルニ三回、豪雨ハ過度、
多肥栽培ト相持テ甚外シキ倒伏ヲ來シ鳥メニ病害其他ノ調査
ヲ充分遂行シ得サルモノアリ、施肥量ハ一般ニ稍多肥ニ過ギタル

坡2

カノ如ク觀察セラル、一般ニ出穗期ハ昨年ニ比シ大差ナクレドモ、或
熟期ハ昨年ニ比シ約十日乃至二週間早ウリキ、然レドモ一般的ニ
ハ此較的的良好ニ経過セルモノ云コトヲ得ベシ

(四) 標準栽培ニ依ル雜種第四代以後ノ系統育成試験

一、採用面積 二、及五畝歩

三、供試系統數三七組 大四人系統

三、試験経過、概況

一般ニ極メテ良好ニ経過ミタレドモ多少稻熱病、發生ト倒伏ヲ見
ム、他生育狀態ヨリ觀察シ標準栽培トニハ稍多肥ニ過ギタル
カノ如ク認メラレタリ

四、選拔並ニ調査

1、系統群並ニ單獨系統、第一次選拔

本試験ニ於ケル供試系統ハ多肥栽培ニ依ル雜種第四代以後ノ系統

坡1

育成試験ニ於ケル供試系統ト全ノ間ヘノ繁殖ナシハ先ツ早、平晚各型別ニ多
肥沃ニ於テ優良ナル系統群及單獨系統ニ選抜シ標準區ニ於テハタゞ肥
沃ニ於テ選拔セラレサル至總ニシ就テ半中體各型別ニ優良系統群
並ニ系統ヲ選拔セリ但シ圃場ニ於テ廿木ド優良ト認メサルモノニテモ未
固定生産力検定試験ニ供用セキ系統群ハ之ヲ選抜系統群ト見做
シタリ

八 収納

第一次選抜系統群ニ属人生產系統ニ選拔單獨系統ハ各住意ニ三。株
(約一粒分)ヲ個体別ニ収納セリ

九 調査

収納セル不遠ハ各系統毎ニ母本候補群トソレ以外ノ群トニ分ケ種長 種長
等ノ規定ノ調査ヲ母本群トソレ以外ノ群トニ歩リテ三〇株ニ就キテ調
査セリ但シ一株總重ハ三。株ヲ一度ニ測定シ算出シ玄米調査ハ母本

候補群ニシ就キテ一個体當リ各一穗宛取消ニテ調査セリ高調査

度始前ニ當リ春固定生産力検定試験ニ供用セキ系統群ハ就キテハ、未
固定生産力検定試験ニ於ケル成績ト該系統群ノ圃場ニ於ケル觀察
トニ依リテ繼續試験又ベキ價值ナキエト認メタル系統群ハ之ヲ淘汰
セリ但シ淘汰系統群中ニ於テ二特ニ優良ナル系統ハ之ヲ調査セリ

二、第二次選拔

右ノ調査ニ依リ不良系統群並ニ系統ヲ淘汰シ選拔系統群中ヨリ更ニ
優良系統ヲ選拔セリ淘汰セタル系統群並ニ系統中ニ於テモ稍良好
ナル系統並ニ個体アレドモ其々変異性ヲ考慮セバ特ニ優良ト認ムベキ
モノナカリキ

三、最終選拔

四年度ニ於ケル栽培面積ニ依リテ最終選拔系統數ヲ定メ最終ノ系
統選拔ヲ行ヒ之等ニ属スル各系統ノ母本候補群ヨリ母本ヲ選定セリ

備考

最終選拔系統ニ属スル系統ニシテ納用矣セ凡系統ノ母本以外、個体群ハ不良個体ヲ除去シ之ヲ四年度ニ於ケル末固定系統生産力検定試験不良個体ヲ除去シ之ヲ四年度ニ於ケル末固定系統生産力検定試験

1 供試材料トセリ

五 試験成績概括

第二次選拔系統群、特性ハ別表ノ如ク選拔系統數、概括並ニ其、特性ニ関スル概評ハ之ヲ多肥栽培ニ依ル雜種第四代以後、系統育成試験ノ成績概括、項ニ併セテ記載スルヲ、セリ

(五) 多肥栽培ニ依ル雜種第四代以後、系統育成試験

一 供用面積 二及五畝歩

二 供試系統數 三七組 六四八系統

（標準栽培ニ依ル雜種第四代以後、系統育成試験材料ト同、系統也）

三 試験経過、概況

岐6

八月中旬頃迄ハ一般ニ良好ニ経過シタレドモ以後ニ於テ稍著シキ細熱病ノ發生ヲ見尚ニ三回ノ豪雨ノ為メ強ンド全系統ニ涉リテ倒伏激甚ニシテ一般ニ見レバ稍多肥ニ過ベタル如ク觀察セシタリ然レドモ稍熱病ノ被害ノ強ンドナキ系統群、存在セルコト、倒伏ノ程度並ニ其ノ時期トシ考慮スルニトヽニ依リテ比較的明瞭ニ多肥栽培ニ於ケル優良系統シ選拔スルフトシ得タリ

四 選抜並ニ調査

病害程度倒伏程度及び生育状況、三点ヲ主眼トナシ早、中、晚各型別ニ系統群並ニ單獨系統、第一次選拔ヲ行ヒ以後、調査ハ標津栽培ニ依ル雜種第四代以後、系統育成試験ト同一、調査ヲ

行ヒタリ

五 試験成績、概括

第二次選拔系統群、特性ハ別表ノ如ク選拔系統數、概括並ニ其

岐5

ノ特性ニ關スル如猶、評ヲ便宜上標津栽培ニ於ケルモノト儀也テ、記載セバ次ノ

卷之二

選拔系統數 / 概率

交	組	令	配	代	毒	減	植	系	統	數	標	準	裁	塔	還	設	系統數	並三個體數		
上	州	X	愛	國	處	女	處	風	X	荒	木	五	五	五	五	五	多	肥	裁	培
					愛	愛	惠		X	大	場	五	五	五	五	五	個	體	數	
					豐	國	惠	惠	X	穀	島	五	五	五	五	五	體	數		
					無	早	國	無	X	稻	德	五	五	五	五	五	個	體	數	
					是	生	稻	是	X	神	總	五	五	五	五	五	系統	數		
					衣	新	國	衣	X	良	本	五	五	五	五	五	系統	數		
					笠	國	取	笠	X	都	木	一	一	一	一	一	系統	數		
					早	國	選	早	X	木	木	一	一	一	一	一	系統	數		
					晚	國	歲	晚	X	木	木	一	一	一	一	一	系統	數		
					稻	國	力	稻	X	木	木	一	一	一	一	一	系統	數		
					神	國	力	神	X	木	木	一	一	一	一	一	系統	數		
					晚	國	力	晚	X	木	木	一	一	一	一	一	系統	數		

文
8

卷之二

交配組合

代用不熟数

選拔系統並三個株數

標準栽培多肥栽培

晚一七号 X 系保毛号

一五

二

一〇

三

一八一

系保四号 X 系保毛号

四

一五

二

一三三

三四

合計

六四八

三六

一三三

一八一

組合

選拔系統特性概評

女 浪 X 大場

早生型ニシテ標準栽培培ニ於テハ比較的優良ナリ

豊 園 X 福島

品質劣等ナレドモ種熱病ノ被害殆ニド無ク倒伏シ難シ

無毛愛國 X 早福神力

品質劣等ナレドモ種熱病ノ被害殆ニドナク倒伏シ難シ

此ノ系統ハ以後系統育成ヲ要セサルモノト認ム

無毛愛國 X 肥良都

品質劣等ナレドモ種熱病ノ被害殆ニドナク倒伏シ難シ

衣笠早生 X 新開取

多肥栽培ニ於テハ種熱病並ニ倒伏激甚ナレドモ標準

白 塩 X 選 一

多肥栽培ニ於テハ比較的優良ナリ

栽培ニ於テ優良ナリ

曉福神力 X 片 岐

多肥栽培ニ於テハ種熱病ノ發生激甚ナレドモ標準

栽培ニ於テハ比較的優良ナルモノト言フ事ニ得ベシ

上 川 X 愛 國

早生型ニシテ標準栽培培ニ於テ種熱病ノ被害殆ニドナク

中稻神力 X 須賀一木

長稈ナレドモ多肥栽培ニ於テ種熱病ノ發生殆ニドナク

比較的倒伏シ雖ニ品質其ノ他ノ点ニ就キテ標準栽培

培並ニ多肥栽培ニ於テ比較的優良ナリ

選 一 X 竹 城

多肥栽培ニ於テ種熱病ノ發生比較的少ナク倒伏シ

難シ標準栽培並ニ多肥栽培ニ於テ生産力比較的
大ナリ品質優良ナレドモ極メテ小粒ナリ

雄 斧 X 國 取

一般ニ標準栽培ニ於テハ良好ナリ多肥栽培ニ於テモ
稲熱病ノ發生少ナク又比較的倒伏シ難キ系統アリ

一般ニ品質良好好ナリ

中稻神カ X 雄町

一般ニ標準栽培ニ於テハ良好ナリ多肥栽培ニ於テモ
稲熱病ノ發生少ナク又比較的倒伏シ難キ系統アリ
多肥栽培ニ於テ稲熱病ノ發生少ナク倒伏シ難シ
標準栽培ニ於テハ比較的優良ナレドモ多肥栽培ニ於テ
八稲熱病ノ發生最モ激甚ナリ

竹成 X 神力

多肥栽培ニ於テハ白葉枯病ノ發生激甚ナレドモ稲熱
病ノ發生ハ比較的少ナク又倒伏モ甚シカラズ

信州 X 愛國

多肥栽培ニ於テ稲熱病ノ發生甚メ少ナク、單純晚シ
通ニテ比較的優良ナル個体多シ

早稻神カ X 愛國

標準栽培ニ於テモ比較的良好好ナレドモ特ニ多肥栽培

岐12

ニ於テハ稲熱病ノ發生殆ンドナク倒伏極メテ輕少ニ
シテ生長状況極メテ良好ナリ早生型ニ於テ特ニ優
良ト認ムモノアルコトハ注目ニ價ス尚粒ノ特性ハ早稻神
カニ近シ此組合ヒニ属ヌル系統ハ多肥栽培ニ於テハ本
年度某ノ生育状況ヨリ見テ來ハ場所、關係ナニモ
トノ凝固ヲ有スレドモ本年度育成試験中最モ良好
ナルモノナリ

大和カ X 藤早生

極メテ早生型ニシテ多肥栽培ニ於テハ比較的良好ナリ
美濃早生 X 宇兵团工

極メテ早生型ニシテ多肥栽培ニ於テハ比較的良好ナリ
片 宮 X 晚白蓮

ハ系統ハ極メテ晚生型ナリ多肥栽培ニ於テ稲熱病ノ
發生殆ンドナリ

神力 X 晚白蓮

品質劣等ナレドモ標準栽培ニ於テハ比較的良好好ナリ

五二八×晚白蕉 品質劣等ナレドモ標準栽培ニ於テハ比較的良好ナリ
晚七号×不保毛早 品質劣等ナレドモ特殊ノ型態ヲ有シ比較的良好ナリ

(六) 標準栽培ニ依ル本固定系統生産力検定試験

一 供用面積 一反六畝半

二 供試系統數

本固定系統 四七系統

関係府縣優良品種 二三品種

地力標準品種 一品種

三 調査

本年度ニ於テハ一系統ヲ二坪三五割トシテ栽培シ状量調査以後ハ云云ヲ合
併シテ調査ヲ行ヒ粗歎ヲ調査スルニ當面ソトクヲ除去スモ際ニ水運ヲ行ヒテ

四 試験経過・概況

経過ハ一般ニ良好ナレドモ病害、發生ト倒伏ヲ見度カラセタリ

五 試験成績概括

成績表ハ別表ノ如ク本試験ヲ行ヘ土地ハ比較的均一別素変異無(參照)

ナリヤ

供試雜種系統ノ成績ノ判定ハ本試験ニ挿入セル関係府縣ノ優良品種ト
早、中、晚各型別ハ比較ヲ行ヒタリ 生産力ニ於テハ更異係數ヲ考慮シテ
比較シ病害倒伏其他品質等ニ就キテ多肥栽培ニ依ル本固定系統生産力
検定試験ノ成績ヲ參照シテ比較ヲ行ヒ雜種育成試験ニ於ケル淘汰、
参考ニ供セリ本試験ノ成績並ニ多肥区ニ於ケル成績ヲ參照シテ時ニ
優良ト認メタルモノ次ノ如シ

系統番号	世代	交配組合	系統番号	世代	交配組合
二、鷄糞五五四	第七代	豊國×福島	三、鷄糞一三二一	第五代	牛精神力×須賀一本
"	"	"	"	"	"
七三八	第六代	白毛×選一	"	"	"
三三三	第五代	精神力×竹城	八五三	第五代	精神力×選一
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"

(七) 多肥栽培ニ依ル本固葉叢発生産力検定試験

一、供用面積 一反七畝歩

六、供試系統數 六二四三

三、調査 (六二四三)

四、試験経過・概況

八月中旬頃頃迄ハ一般ニ良好ニ經過シタレドモ以後ニ於ケル豪雨ト肥料過多ノ爲メニ申、晚霜ニ於テ特ニ著シキ倒伏ト精神病ノ發生ヲ見タリ精神病ノ著シキ發生ハ供試系統ノ耐病性程度ノ判定上本試験ノ目的ヲ達スルコトヲ得タリ 倒伏ハ早生型ニ属スモノ、外一般ニ激甚ナ

レドモ倒伏、時期ヲ考慮スル時ハ畠々倒伏、程度ヲ推定スルコトヲ得タリ

然レドモ一般ニ施肥量過多ノ感アリ

五、試験成績概括

本試験ノ成績ノミニ就キ見レバ品質其ノ形質甚少劣等ナレドモ倒伏及精神病ニ対シ抵抗性ヲ有セモノト認メラニ系統アリ。

尚標準区ニ於ケル成績ト對照スレバ夕霜病接ニ於テハ標準栽培ニ於ケルコクモ著シキ生產量ヲ増加スベキモノト推定サル、系統ナムシモアラカル加如ナレドモ次ニ述べル理由ニ依リ此ノ点ヲ明ニスルコトヲ得サリヤ

一般ニ早生系統ニ於テハ精神病ノ發生極メテ僅少ニシテ且ツ倒伏、程度極メテ輕微ナル爲スニ標準栽培ニ於ケルモノヨリ生產量ヲ増加セシ如クナレドモ中、晚生系統ニ於テハ倒伏ト精神病ノ發生甚タシク株張り穂數等、生育狀況良好ナルニカ、ウラズ標準栽培ニ於ケルモノヨリ著シク收量ヲ減少セリ 而シテ本試験ニ於ケル生產量ヲ以テ直ニ耐肥性

ノ、標識下に事ヲ得サ凡モ、ト思考又何トナレバ精穀實量、減少ハ總

首稱熱病、發生ニ依ル外ハ倒伏ニ因ル事最尤文ナリ而シテ倒伏、

程度並ニ倒伏ニ係ル致量、減少程度ハ出穗期(生育、時期)ト風雨

、時期トニ關係又見ニ下農之大ナリシナル事ヲ認メタリ

本試験ニ於ケル成績ハ標準区ニ於ケル成績ト共ニ雜種育成試験ニ
於ケル淘汰、参考ニ供セリ

(八) 病種交配用品種選定試験

一、試験ノ種類

1、多胞栽培

二、本試験

三、予備試験

四、標準栽培

五、供用面積

不 多 胞 栽 培 一 反 八 敏 步 内 謂 本 試 騐 一 反 三 敏 步 予 備 試 騐 六 敏 步

五、標準栽培 八 敏 步

三、供試品種段

1、多胞栽培

二、本試験 一四五品種

三、予備試験 一四八品種

六、標準栽培 (四五品種 (多胞栽培本試験ト同品種))

四、試験経過、概況

多胞区ニ於テハ過度ノ多窒素栽培ヲ行ヒ相熱病、發生ヲ促進セントシ

タニニク、ツラズ葉稱熱病、發生極メテ少ナソ入日中旬頃迄ハ其解ニ達

過セリ然レ下之生育状況ヨリ見テ穗首稱熱病、相當激甚ナリ發生

ラ予期シタレドミ九月ニ至リテ風雨毎ニ殆シト各区ニ達リテ甚ダシ、倒

代シ白葉病、癰首補熱病、調査ノ完全ニ遠行ルトヲ得ザリキ

禪津西八八嚴二良好二經過七

五、試驗本續，概

成績表八別表ノ如シ

此解述、如ク本試験ニ居テ病害ニ對スル耐病性品種、選定ニ基外遺憾トス
ル所ナレドモ種熟ニ對シテ比較的抵抗性ヲ有ヘシト思ハル、品種並ニ文
配用母本トシテ特殊、實用的優良素因ヲ有スベシト思考サル、品種
次ノ如シ

備考 本試験ノ成績表ニ依リ品種同ノ特性ノ比較ヲナス場合次ノ事項

ハ涼意スベキモノトス

不一株全重量調査ニ當リ乾燥程度ニ充分留意シタルニカ、ウシス
期ニ依リ其ノ乾燥程度著シク異ナリタルモアリト認ムル迄アルニ依リヘ
株全重量、品種間ニ於ケル比較ヲナシ得ズ、雖ウテ穂重率合モ同様

比較 ナスマトヲ得ズ

只予備試駆ハ圓錠ノ開栓上一部番外地ヲ使用シ該番外地ハ幾分肥
料少ナカクシモノト認ムル所アルニヨリ全体ヲ通シテノ比較ヲナスコトシ得
タメ肥度既本底發達ヘ被導來接

二、比較的倒伏：難半品种

八月、晚稻二處テハ倒伏ノ時頃ヲ考慮ミテ選定ス

成績表

昭和參年度

(7.)

標準栽培法之雜種第四代以後，系統育成試驗成績表

第二次選拔系統群並二單獨系統成績

1) 園場觀察

世代	交配組合	系統番號	出穗始期	出穗期	穎摘期	穎摘日數	成熟期	結實日數	倒伏	病害	備考
F7	母、安 適	27系277-1	8.8	8.13	8.14	6	9.26	43	多	中	
	" -2	8.11	8.13	8.14	3	9.26	43	中	中	中	
	父、大 湯	" -3	8.11	8.13	8.14	3	9.26	43	中	中	
	" -4	8.10	8.13	8.14	4	9.26	43	多	適	中	
	" -5	8.9	8.13	8.14	5	9.26	43	適	中	中	
		平均	8.10	8.13	8.14	4	9.26	43	中一基	中	
F7	母、豐 國	27系554-1	8.12	8.16	8.17	5	9.28	42	少	中	
	" -2	8.12	8.16	8.17	5	9.28	42	少	中	中	
	" -3	8.12	8.16	8.17	5	9.28	42	多	中	中	
	父、福 島	" -4	8.12	8.16	8.17	5	9.28	42	基	中	
	" -5	8.12	8.17	8.18	6	9.28	41	基	中		
		平均	8.12	8.16	8.17	5	9.28	42	少一基	中	

251

252

F7	母、矮紫早生	27系720-1	8.22	8.24	8.25	3	9.30	36	少	△	
	" -2	8.22	8.24	8.25	3	9.30	36	△	△		
	" -3	8.22	8.23	8.24	2	9.30	37	△	△		
	" -4	8.21	8.22	8.23	2	9.30	38	△	△		
	" -5	8.21	8.22	8.23	2	9.30	38	△	△		
		平均	8.22	8.23	8.24	2	9.30	37	△	△	
F6	母、白 雜	27系737-1	9.4	9.6	9.7	3	10.18	41	△	△	
	" -2	8.30	9.4	9.5	6	10.18	43	△	△		
	" -3	8.31	9.3	9.4	4	10.16	42	△	△		
	父、撰 一	" -4	8.31	9.3	9.5	4	10.18	43	△	△	
	" -5	8.31	9.2	9.3	3	10.13	40	△	△		
		平均	8.31	9.4	9.5	4	10.18	42	△	△	
F5	母、晚縮神力	27系853-1	8.30	9.2	9.3	4	10.12	39	△	△	
	" -2	8.31	9.3	9.4	4	10.13	39	△	△		
	" -3	8.31	9.2	9.3	3	10.13	40	△	△		
	父、竹 武	" -4	9.1	9.2	9.3	2	10.13	40	△	△	
	" -5	8.28	9.1	9.2	5	10.13	41	△	△		
		平均	8.31	9.2	9.3	3	10.13	40	△	△	

世代	交配組合	系統番号	出穂期	出穂期	摘穗期	穀粒数	成熟期	結實期	倒伏	病害	備考
F5	母晚稲神力	27系918-1	9.2	9.5	9.6	4	10.11	35	△	中	
	" - 2	9.3	9.6	9.8	5	10.20	42	△	少		
	" - 3	9.2	9.5	9.6	4	10.18	42	△	少		
	父竹成	" - 4	9.2	9.4	9.5	3	10.18	43	△	少	
	" - 5	9.2	9.4	9.5	3	10.18	43	△	少		
平均				9.2	9.5	9.6	4	10.18	41	△	少
F5	父上州名	27系1012-3	8.11	8.14	8.15	4	-	-	△	△	
F5	母上州名	27系1083-2	8.18	8.21	8.22	4	-	-	△	△	
F5	母櫻一	27系1263-1	8.28	9.2	9.3	6	10.15	42	△	△	
	" - 2	8.30	9.3	9.4	5	10.15	41	△	△		
	" - 3	8.28	8.30	8.31	3	10.13	33	△	△		
	父竹成	" - 4	8.21	9.3	9.4	14	10.15	41	△	△	
	" - 5	8.28	8.30	8.31	3	10.13	43	△	△		
平均				8.27	9.1	9.2	6	10.14	42	△	△
F5	母櫻一	27系1296-1	9.4	9.7	9.8	4	10.21	43	△	中	
	母櫻一	" - 2	9.3	9.5	9.6	3	10.19	43	△	中	
	" - 3	9.3	9.5	9.6	3	10.19	43	△	多		
	父竹成	" - 4	9.4	9.5	9.6	2	10.19	43	△	中	
	" - 5	9.4	9.5	9.6	2	10.19	43	△	中		

		" - 5	9.2	9.4	9.6	4	10.19	43	△	少	
平均				9.3	9.5	9.6	3	10.19	43	△	少-多
F5	母櫻一	27系1316-1	9.2	9.3	9.4	2	10.14	40	△	中	
	" - 2	9.2	9.3	9.4	2	10.14	40	△	少		
	" - 3	9.2	9.3	9.5	3	10.15	40	△	中		
	父竹成	" - 4	9.2	9.4	9.5	3	10.15	40	△	少	
	" - 5	9.4	9.5	9.6	2	10.15	39	△	少		
平均				9.2	9.4	9.5	2	10.15	43	△	少-中
F4	母旗町	27雜395-1	8.29	9.1	9.2	4	10.13	41	△	△	
	" - 2	8.31	9.1	9.2	2	10.13	41	△	△		
	" - 3	8.30	9.1	9.2	3	10.13	41	△	△		
	父圓取	" - 4	8.30	9.1	9.3	4	10.13	40	△	△	
	" - 5	8.29	9.1	9.2	4	10.13	41	△	△		
平均				8.30	9.1	9.2	3	10.13	41	△	△
F4	母雄町	27雜398-1	9.5	9.7	9.8	3	10.28	50	中	△	
F4	父圓取	27雜406-1	8.30	9.1	9.2	3	10.14	42	少	△	
F4	母雄町	" - 2	8.30	9.1	9.2	3	10.14	42	少	△	

世代	交配組合	系統番号	出穂始	出穂期	穂場期	穂端日数	成熟期	結果日数	倒伏	病害	備考
F4	父雄町	28'系 1397	8.28	8.30	8.31	3	10.10	40	△	△	△
		" 1398	9.4	9.5	9.6	2	10.16	40	△	△	△
		" 1399	8.31	9.4	9.5	5	10.16	41	△	△	△
	父田取	" 1400	8.30	8.31	9.3	4	10.14	41	△	△	△
		" 1401	8.30	9.4	9.5	6	10.16	41	△	△	△
		平均	8.31	9.3	9.4	4	10.14	41	△	△	
F4	父雄町	28'系 1402	9.4	9.5	9.6	2	10.15	39	△	△	△
		" 1403	9.3	9.5	9.6	3	10.15	39	△	△	△
		" 1404	9.3	9.5	9.6	3	10.16	40	△	△	△
	父田取	" 1405	9.2	9.4	9.5	3	10.16	41	△	△	△
		" 1406	9.2	9.5	9.6	4	10.16	40	△	△	△
		平均	9.3	9.5	9.6	3	10.16	40	△	△	
F4	母中稻神力	27'雜 530-1	8.31	9.2	9.3	3	10.14	41	△	△	△
		" -2	8.29	9.2	9.3	5	10.14	41	△	△	中
		" -3	8.29	9.1	9.2	4	10.14	42	△	△	△
	父雄町	" -4	8.28	8.31	9.1	4	10.14	43	△	△	△
		" -5	8.30	9.2	9.3	4	10.15	42	△	△	△
		平均	8.29	9.2	9.2	4	10.14	42	△	△	△-中

表 5

世代	交配組合	系統番号	出穂始	出穂期	穂場期	穂端日数	成熟期	結果日数	倒伏	病害	備考
F4	母中稻神力	28'系 1452	8.29	9.3	9.4	5	10.19	45	△	△	△
		" 1453	9.4	9.2	9.8	4	10.24	46	△	△	△
		" 1454	8.31	9.3	9.4	4	10.14	40	△	△	△
	父雄町	" 1455	8.27	8.29	8.31	4	10.13	43	△	△	△
		" 1456	8.31	9.3	9.5	5	10.14	39	△	△	△
		平均	8.31	9.3	9.4	4	10.16	43	△	△	
F4	母中稻神力	28'系 1462	8.29	9.2	9.3	5	10.14	41	△	△	△
		" 1463	8.30	9.1	9.2	3	10.14	42	△	△	△
		" 1464	8.29	8.31	9.1	3	10.14	43	△	△	△
	父雄町	" 1465	8.29	9.1	9.2	4	10.14	42	△	△	△
		" 1466	8.26	8.30	8.31	5	10.11	41	△	△	△
		平均	8.29	9.1	9.2	4	10.13	42	△	△	
F4	母中稻神力	28'系 1467	8.25	8.30	8.31	6	10.11	41	△	△	△
		" 1468	8.28	9.1	9.2	5	10.10	38	△	△	△
		" 1469	8.27	8.31	9.1	5	10.9	38	△	△	△
	父雄町	" 1470	8.28	8.30	8.31	3	10.9	39	△	△	△
		" 1471	8.27	8.30	8.31	4	10.9	39	△	△	△
		平均	8.27	8.31	9.1	5	10.10	39	△	△	

表 6

世代	交配組合	系統番号	出穂始收穫期	穀熟期	穀熟日数	成熟期	结实日数	倒伏	病害	備考
F4	母中稻神力	28系 1472	8.25	8.30	9.1	7	10.10	39	△	△
		" 1473	8.29	9.2	9.3	5	10.14	41	△	△
		" 1474	9.1	9.5	9.6	5	10.16	40	△	△
	父雄町	" 1475	8.28	9.1	9.2	5	10.13	41	△	△
		" 1476	8.30	9.4	9.7	8	10.16	39	△	△
		平均	8.29	9.3	9.4	6	10.14	40	△	△
F4	母早稻神力	28系 1477	8.20	8.25	8.28	8	10.2	35	少	中
		" 1478	8.24	8.26	8.28	4	10.2	35	少	中
		" 1479	8.23	8.25	8.24	4	10.2	36	中	中
	父穀良都	" 1480	8.19	8.23	8.27	8	10.2	36	少	中
		" 1481	8.23	8.24	8.24	1	10.2	39	中	中
		平均	8.22	8.25	8.27	5	10.2	36	少-中	中
F4	母早稻神力	28系 1482	8.22	8.25	8.26	4	10.4	37	△	中
		" 1483	8.20	8.23	8.24	4	10.4	41	△	中
		" 1484	8.22	8.23	8.24	2	10.4	41	△	中
	父穀良都	" 1490	8.22	8.23	8.24	2	10.4	41	△	多
		" 1491	8.22	8.23	8.24	2	10.4	41	△	中
		平均	8.22	8.23	8.24	2	10.4	41	△	中-多

世代	交配組合	系統番号	出穂始收穫期	穀熟期	穀熟日数	成熟期	结实日数	倒伏	病害	備考
F4	母早稻神力	28系 1492	8.20	8.21	8.23	3	10.2	40	△	中
		" 1493	8.20	8.21	8.23	3	10.2	40	△	中
		" 1494	8.21	8.23	8.24	3	10.2	39	△	中
	父穀良都	" 1500	8.21	8.24	8.25	4	10.2	38	△	中
		" 1501	8.21	8.23	8.24	3	10.2	39	△	中
		平均	8.21	8.23	8.24	3	10.2	39	△	中
F4	母竹城	28系 1357	9.5	9.6	9.7	2	10.26	49	△	△
		" 1358	9.4	9.6	9.7	3	10.26	49	△	少
		" 1359	9.4	9.6	9.7	3	10.26	49	△	少
	父神力	" 1360	9.3	9.5	9.6	3	10.26	50	△	△
		" 1361	9.3	9.5	9.6	2	10.26	50	△	△
		平均	9.4	9.6	9.7	3	10.26	49	△	△-少
F4	母竹城	28系 1362	9.4	9.6	9.7	3	10.25	48	△	△
		" 1363	9.5	9.6	9.7	2	10.25	48	△	△
		" 1364	9.5	9.6	9.7	2	10.25	48	△	△
	父神力	" 1365	9.3	9.6	9.7	4	10.25	48	△	△
		" 1366	9.5	9.6	9.7	2	10.25	48	△	少
		平均	9.5	9.6	9.7	2	10.25	48	△	A-少

世代	交配組合	系統番号	出穂始	出穂期	穂揃期	穂揃日数	成熟期	結實期数	倒伏	病害	備考
F4	母信州	28系 1322	8.11	8.16	9.3	23	-	-	△	△	
		1323	9.3	9.5	9.6	3	-	-	△	△	
		1324	8.11	9.3	9.4	24	-	-	△	△	
	父愛國	1325	8.12	9.3	9.4	23	-	-	△	△	
		1326	8.11	9.4	9.6	26	-	-	△	△	
		平均				-	-	-	△	△	
F4	母信州	28系 1337	8.13	8.28	9.1	19	-	-	△	△	
		1338	8.11	8.30	9.2	22	-	-	△	△	
		1339	8.12	8.31	9.4	23	-	-	△	△	
	父愛國	1340	8.27	9.2	9.3	7	-	-	△	△	
		1341	9.4	9.5	9.6	2	-	-	△	△	
		平均				-	-	-	△	△	
F4	母神力	27系 1878-1	9.6	9.7	9.8	2	10.29	42	△	少	
		-2	9.5	9.7	9.8	3	10.29	42	△	少	
	父晚白矮	-3	9.6	9.7	9.8	2	10.29	42	△	少	
		1522	9.1	9.2	9.3	2	10.15	42	△	少	
		1523	9.1	9.2	9.3	2	10.15	42	△	少	
		1524	8.28	9.1	9.2	5	10.15	43	△	少	
	父晚白矮	1525	9.1	9.2	9.3	2	10.15	42	△	少	
		1526	9.1	9.2	9.3	2	10.15	42	△	少	
		平均									

表 6

F4	母 F3528号	28系 1522	9.1	9.2	9.3	2	10.15	42	△	少	
		1523	9.1	9.2	9.3	2	10.15	42	△	少	
		1524	8.28	9.1	9.2	5	10.15	43	△	少	
	父晚白矮	1525	9.1	9.2	9.3	2	10.15	42	△	少	
		1526	9.1	9.2	9.3	2	10.15	42	△	少	
		平均									
F4	母 F3528号	1538	8.23	8.31	9.4	12	10.13	39	△	△	
		1539	8.7	8.28	9.1	25	10.12	41	△	△	
		1540	8.8	8.19	9.2	25	10.13	41	△	△	
	父晚白矮	1541	8.8	8.20	9.2	25	10.13	41	△	△	
		平均									
		1542	9.5	9.6	9.7	2	10.15	38	△	△	
F4	母晚白矮 父系保27号	1543	9.5	9.8	9.11	6	10.25	44	△	△	
	父系保27号	1544	9.6	9.8	9.11	6	10.25	44	△	△	

表 10

2) 繁育及特性調查

世代	交配組合	本株番号	母 長	母 短	父 長	父 短	穗 數	穗 形	穗 粒數	粒 形	粒 大小	心 多	腹 多	芒 有	穗 色	穗 選拔	備考		
																	編 號	編 號	
		27系277-1	95C	21C	11	23	21	AC	中C	雄C	中C	中C	中C	AC	少S	AC			
F7	母女波	-2	96C	22C	11	24	2.2	AC	中C	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	5	0
		-3	93C	22C	11	24	2.2	稀A	中C	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		
F7	父大場	-4	95C	22C	10	23	2.3	稀A	中C	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		
		-5	94C	21C	11	23	2.1	稀A	中C	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		
		平均	95C	22C	11C	23	2.2	稀A	中C	雄C	中C	中C	AC	少S	AC				
		"564-1	98C	24C	7	26	3.7	稀A	雄C	雄C	太C	中S	少S	中S	紅C				
F7	母豐國	-2	99C	23C	7	29	4.1	AC	穀C	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4C	4C	4C	5	0
		-3	100C	24C	7	25	3.6	稀A	穀C	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		
F7	父福島	-4	101C	24C	7	26	3.7	稀A	穀C	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		
		-5	103C	24C	8	29	3.6	稀A	穀C	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		
		平均	100.8	24C	7C	27	3.7	稀A	穀C	雄C	太C	中S	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		
		"720-1	92C	24C	7	28	3.3	少S 短A	穀C	雄C	中C	中S	AC	少S	AC				
F7	母衣笠早生	-2	95C	24C	7	24	3.4	少S 短A	穀C	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	5	0
		-3	95C	24C	7	22	3.1	少S 短A	穀C	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		
F7	父新開原	-4	93C	24C	6	22	3.7	少S 短A	穀C	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		

32

		"720-5	93C	25C	7	21	3.0	少S 短A	穀C	雄C	中C	中C	AC	少S	AC			
		平均	94C	24C	7C	22	3.3	少S 短A	穀C	雄C	中C	PC	AC	少S	AC			
		"837-1	94.8	20S	12	28	2.2	AC	穀C	穀C	中C	PC	AC	2.5	紅C	5	0	
F6	母白蘿	-2	92.8	20C	10	24	2.4	AC	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		
		-3	89C	19C	11	25	2.3	AC	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		
F6	父選一	-4	91C	20C	12	24	2.3	AC	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		
		-5	94C	20C	11	24	2.2	AC	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		
		平均	92.8	20S	11.8	26	2.3	AC	穀C	穀C	中C	PC	AC	少S	紅C			
		"853-1	83C	21C	8	22	2.7	稀A	中C	雄C	中C	PC	AC	PC	紅C			
F5	母晚鶴神力	-2	80C	20C	8	20	2.5	稀A	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	少S	2.5		
		-3	78.8	20C	8	20	2.5	稀A	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	中S	2.5		
F5	父竹成	-4	78C	20C	8	23	2.9	AC	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	少S	AC	5	0
		-5	78C	20C	8	21	2.6	AC	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	少S	2.5		
		平均	78.8	20C	8C	21	2.6	稀A	中C	雄S	中C	PS	AC	少S	2.5			
		"918-1	98C	21C	9	27	3.0	AC	中C	易C	中C	中C	AC	少S	AC	5	0	
F5	母晚鶴神力	-2	96.8	21C	8	23	2.9	AC	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	2.5		
		-3	97.8	21C	9	25	2.8	AC	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	2.5		
F5	父竹成	-4	97.8	21C	9	24	2.7	AC	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	2.5		
		-5	91.8	20C	8	22	2.7	AC	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	2.5		
		平均	96.8	21.8	9C	24	2.8	AC	中C	易C	PC	中S	AC	少S	紅S			

33

世代	交配組合系統番号	稈長	穗數	一穗平均穀粒數	株高	長度	粗度	脫粒率	千粒重	玄米	心多	腹多	芒光	備考			
														選拔系統名	總株數		
F5	父愛洲	27系102-3	89.5	21C	8	21	2.6	稀S	蜜C 雜C 中C	中大	中	少	紅S	5	○		
F5	父愛洲	" 103-2	100.5	22.8	8	23	2.9	稀S	蜜C 雜C 細C	中大	中	少	AC	5	○		
		" 1263-1	88.8	19C	10	26	2.6	AC	蜜C 雜C 細C	長C	小C	AC	AC	紅S			
	母選一	" -2	91.8	20C	8	22	2.7	**	" "	長C	小S	少S	**				
F5		" -3	91.0	19C	8	26	3.2	**	" "	中C	小C	**	**	5	○		
	父竹城	" -4	92.8	20C	9	24	2.6	**	蜜B	長C	**	AC	**				
		" -5	88.8	20.8	7	22	3.1	**	1C	長C	**	**	**				
		平均	90.8	20.8	9.8	24	2.8	AC	蜜C 雜C 長C	小S	AC	YS	紅S				
		" 1296-7	84C	19C	9	26	2.9	稀S	蜜C 雜C 中C	中大	少	AC	AC	AC	5	○	
	母選一	" -2	84C	18C	9	24	2.6	**	" "	中C	小C	**	**				
F5		" -3	81.8	18C	10	23	2.3	**	" "	中S	**	少S	**				
	父竹城	" -4	82C	18.8	9	24	2.6	**	" "	中S	**	少S	**				
		" -5	83C	18C	11	24	2.2	**	" "	中C	**	少S	**				
		平均	83.8	18.8	10.8	24	2.5	稀S	蜜C 雜S 中C	中S	1.8	AC	YS	AC			
		" 1316-1	100.8	18C	8	23	2.9	稀S	蜜S 雜C 中C	長C	中C	AC	AC	紅S			
	母選一	" -2	98.8	18.8	8	23	2.9	AC	" "	中C	**	**	**	AC			
F5		" -3	97.8	18.8	8	21	2.6	AC	" "	中C	**	少S	**				
	父竹城	" -4	110.8	18.8	8	23	2.9	稀S	" "	中C	**	AC	**				

		" -5	100.8	18.8	8	24	3.0	稀S	蜜C 中C 中C	長C	中C	AC	少S	AC	5	○	
		平均	99.8	18.8	8C	23	2.9	稀S	蜜S 雜C 中C	長C	中C	AC	少S	紅S			
		27雜395-1	112C	22C	9	27	3.0	AC	中C 細C 中C	中C	大S	少S	少S	AC			
	母雄町	" -2	116C	21C	9	24	2.6	稀S	" "	PC	**	大S	**	**	**		
F4		" -3	106.8	21C	9	24	2.6	**	" "	中S	**	大C	**	**	**		
	父闊取	" -4	111.8	22.8	8	22	2.8	少S	短S	易C	**	大C	**	**	**		
		" -5	110C	22C	8	25	3.1	稀S	" "	中S	大S	**	**	**			
		平均	111.8	22.8	9C	24	2.8	稀S	短S	中C	易S	中S	3.5	少S	AC		
F4	母雄町	" 393-1	109C	22.8	9	26	2.9	DC	中C	難C	中C	中C	AC	中S	AC		
F4	父雄町	" 406-1	102.8	21.8	8	26	3.3	稀S	中C	難C	中C	中S	AC	少S	AC		
F4	父雄町	" -2	101.8	21.8	9	26	2.9	稀S	PC	難S	中C	中S	少S	少S	AC	5	○
		28系1397	90C	19C	9	19	2.1	AC	中C 細C	中C	中S	AC	AC	AC			
	母雄町	1398	93C	19C	8	20	2.5	**	" "	中C	PC	**	**	**			
F4		1399	93C	19.8	8	22	2.7	**	" "	中C	中S	**	少S	**			
	父闊取	1400	92.8	23.8	10	24	2.4	**	" "	易C	中S	少S	少S	**	5	○	
		1401	94C	20.8	9	22	2.4	**	" "	易C	中C	中C	AC	少S	**		
		平均	92.8	20.8	9.8	21	2.4	AC	易S	中C	中S	少S	7.5	AC			

支 15

	28系	1462	96S	20S	8	24	3.0	中S	中A	中S	中S	中C	中C	中S	少S	少C	少A	
F4	母中精神力	"	1463	97C	21C	9	25	2.8	中S	中A	中C	中C	中C	中S	中S	中S	少S	少C
	"	1464	97C	20S	10	28	2.8	稀S		中C	易C	44	中S	中A	中S	中S	44	
	父雄町	"	1465	101C	20S	9	26	2.9	AC		中C	中C	44	中C	中C	少S	中S	44
	"	1466	97C	21S	9	26	2.9	中S	中S	中C	中C	44	中C	中C	中S	中S	44	
	平均		98S	20S	9.5	26	2.9	中S	中A	中S	中C	中C	中S	中S	中S	4C		
F4	母中精神力	"	1467	96S	22S	7	23	3.3	AC		中S	易C	中C	中S	中S	少S	多S	AC
	"	1468	100S	22A	7	23	3.3	"	"	中C	44	44	中C	中C	4C	中S	44	
	"	1469	104S	21D	8	28	3.5	"	"	中C	44	44	中C	中C	4C	中C	44	
	父雄町	"	1470	99S	22S	7	24	3.4	"	"	中C	44	44	中S	中S	少S	中S	44
	"	1471	98S	22S	8	25	3.1	"	"	中C	44	44	中C	中C	中S	多S	"	
	平均		99S	22S	7C	25	3.3	AC		中S	易C	中C	中S	中S	少S	中S	AC	
F4	母中精神力	"	1472	94C	21S	8	23	2.9	AC		中S	易C	中C	中C	少S	中S	4C	
	"	1473	91S	20C	12	30	2.5	AC		"	"	"	中S	44	少S	2S	44	
	"	1474	98S	20S	11	31	2.8	AC		"	"	"	中C	44	4C	2S	"	
	父雄町	"	1475	29S	20E	11	30	2.7	稀S		"	"	"	中C	44	少S	中S	"
	"	1476	97S	20S	11	31	2.8	稀S		"	"	"	中S	44	少S	少S	44	
	平均		94S	20S	11S	29	2.7	稀S		中S	易C	44	中S	TPC	少S	2S	4C	

番 号	文 組 合 系 統 名	科 名	被 檢 樣 本 數	一 總 平 均 株 高 度	根 莖 粗 細	老 葉 數 量	老 葉 色 調	粗 陳 體 質	附 着 根 易	太 米 狀 根	細 根	雲 形 根	大 根 部	心 部 少 量	腹 部 少 量	老 根 部	備 註	考 證 文 獻 出 處	備 考
1473	978	218	12	29	2.3	AC	中C	易C	中C	中C	少S	少S	AC						
母早福神力	1478	1008	208	12	29	2.4	"	蜜S	"	"	中C	中C	AC	中S	AC				
F4	1479	958	208	11	26	2.4	"	蜜S	"	"	中C	中C	AC	中S	"				
父親良鄰	1480	948	218	12	29	2.4	"	"	"	中S	中C	少S	中S	"					
"	1481	968	218	12	29	2.4	AC	"	"	"	中S	中S	中S	中S	"				
	平均	968	218	12	28	2.4	AC	蜜S	易C	中C	中S	少S	中S	AC					
"	1488	898	208	11	29	2.6	稀S	蜜S	易C	中C	中C	少S	多C	AC					
母早福神力	"	1488	938	218	10	27	2.7	AC	中C	"	"	中E	大S	中S	多C	"			
F4	"	1489	898	218	10	28	2.8	稀S	"	"	"	中C	中C	多C	多C	"			
父親良鄰	"	1490	908	208	10	28	2.8	AC	"	"	"	中S	中S	中S	中S	"			
"	1491	898	218	12	29	2.4	AC	"	"	"	中S	中S	中S	多S	"	5	0		
	平均	908	218	11.8	28	2.7	稀S	中S	易C	中C	中S	中S	中S	多S	AC				
"	1492	838	210	10	25	2.5	AC	中C	易C	中C	中C	多S	多S	AC					
母早福神力	"	1492	888	208	10	26	2.6	"	"	"	"	中S	中S	多S	"				
F4	"	1499	868	210	9	26	2.9	"	"	"	"	中C	中C	中S	中S	"			
父親良鄰	"	1500	860	218	10	27	2.9	"	"	"	"	中C	中C	少S	少S	"			
"	1501	860	210	9	25	2.8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	0		
	平均	868	218	10.8	26	2.9	AC	中C	易C	中C	中S	中S	中S	中S	AC				

第 5

番 号	文 組 合 系 統 名	科 名	被 檢 樣 本 數	一 總 平 均 株 高 度	根 莖 粗 細	老 葉 數 量	老 葉 色 調	粗 陳 體 質	附 着 根 易	太 米 狀 根	細 根	雲 形 根	大 根 部	心 部 少 量	腹 部 少 量	老 根 部	備 註	考 證 文 獻 出 處	備 考
1357	1078	208	11	24	2.2	AC	中C	甚易C	平C	中C	少C	少C	少C	少C	少C	少C	少C	少C	
母竹成	"	1358	1030	208	11	24	2.2	"	"	"	"	中S	中S	中S	中S	AC			
F4	"	1359	998	208	11	24	2.2	"	"	"	"	中C	中C	中S	中S	"			
父神力	"	1360	1008	218	10	26	2.6	"	"	"	"	中C	中C	中S	中S	AC			
"	1361	998	210	10	23	2.3	"	"	"	"	中C	中C	中S	中S	少S	少S	少S		
	平均	1028	208	11.8	24	2.3	AC	中C	甚易C	中C	少C	少C	少C	少C	少C	少C	少C		
"	1362	1048	210	10	23	2.3	AC	中C	易C	中C	中S	少C	少C	中S	少C	少C	少C		
母竹成	"	1363	1038	192	10	25	2.5	"	"	"	"	中C	中C	中S	中S	"			
F4	"	1364	998	206	9	23	2.6	"	"	"	"	中C	中C	中S	中S	5	0		
父神力	"	1365	1028	215	9	22	2.4	"	"	"	"	中C	中C	中S	少C	少C	少C		
"	1366	1038	208	10	24	2.4	"	"	"	"	中C	中C	中S	中S	少S	少S	少S		
	平均	1028	208	10.8	23	2.4	AC	中C	易C	中C	中S	中C	4C	中S	少C	少C	少C		
28系13221028	210	8	24	30	4C		蜜S	難C	細C	中S	少S	4C	少S	紅S	5		早型產生		
奴信川	"	1323	1054	228	9	25	2.8	"	"	"	"	中S	中S	中S	中S	少S	少S	少S	
F4	"	1324	1058	228	8	26	3.2	"	蜜C	"	"	中S	中S	中S	中S	少S	少S	少S	
交愛國	"	1325	998	235	9	24	2.6	"	"	"	"	中S	中S	中S	中S	少S	少S	少S	
"	1326	1068	220	10	27	2.7	"	蜜S	少C	細C	中C	少C	少C	少C	少S	少S	少S		
	平均	1048	228	9.8	25	2.9	AC	蜜S	難C	細C	中S	中S	4C	少S	紅S				

早型產生

世代	交配組合番号	稟長	穗數	一穂平均重	芒長	芒短	穗疏密	脫殼粒易	穗細	穗形	去壳率	心多	瘦多	芒色	備考		
															體質	固氮	新種系統
	28系1339	95.5	21.5	9	2.0	2.2	△C	中C	難C	細C	中人	11.5	4C	少S	紅S		
F4	父遼州	1338	98.5	21.5	8	2.1	2.6	△C	風S	易C	中人	11.5	4C	中S	△S		
	父遼國	1339	98.5	21.5	10	2.3	2.3	△C	△C	易C	中人	11.5	4C	中S	△S		
	"	1340	105.5	20.5	10	2.5	2.5	△C	風S	易C	中人	11.5	4C	少S	△S		
	"	1341	105.5	22.5	10	2.7	2.7	△C	中C	△C	中人	11.5	4C	少S	△C		
	平均	100.5	21.5	9.5	2.3	2.5	4C	底S	難C	細C	中S	11.5	4C	少S	紅S		
F4	母神力	27組1001	105.5	18.5	14	1.6	△C	中C	易C	中C	圓C	PC	4C	△C	△C		
	"	-21.102.5	18.5	14	2.5	1.8	△C	△C	難S	中C	圓C	中C	△C	△C	△C	5	0
	父晚白芒	-3	107.5	18.5	12	2.2	1.8	△C	△C	圓C	中S	11.5	4C	△C	△C		
	平均	105.5	18.5	13.5	2.3	1.7	4C	中C	難S	中C	圓C	中S	4C	△C	△C		
	28系1522	94.5	20.5	10	2.5	2.5	△S	長S	底C	中人	中C	中S	4C	中S	褐C		
F4	母遼528	1523	22.5	18.5	10	2.3	2.3	△C	△S	易S	△C	中S	4C	△C	△C		
	父晚白芒	1524	93.5	20.5	11	2.3	2.1	△C	△C	△C	△C	△C	4C	△C	△C		
	"	1525	96.5	19.5	10	2.4	2.4	△C	長C	中人	中人	△C	中S	4C	△C	△C	
	"	1526	92.5	20.5	11	2.4	2.2	△C	△C	中人	易C	△C	中C	中C	△S	△C	
	平均	95.5	19.5	10.5	2.4	2.3	△C	長S	底S	易C	中C	中S	4C	△C	褐C		

第2

	28系1533	101.5	20.5	11	2.6	2.4	稀S	中S	△C	△C	中C	4C	PS	4C			
F4	母遼525	"	1533	96.5	20.5	10	2.4	2.4	△C								
F4	父晚白芒	"	1534	19.5	19.5	10	2.3	2.3	△S	△S	△C	△C	△C	△C	△S	△C	
	"	1541	96.5	21.5	11	2.5	2.3	稀S	△C	0							
	平均	96.5	20.5	11.5	2.5	2.4	稀S	中S	△C	△C	中C	△C	△S	△C			
F4	母遼17號	"	1532	102.5	23.5	11	3.0	中S	中S	疏C	難C	△S	長S	△C	△C	△C	5
F4	父遼21號	"	1533	101.5	22.5	11	2.8	2.6	中S	中S	△C	△C	△C	△C	△C	△C	0
F4	父遼19號	"	1555	101.5	22.5	11	2.8	2.6	中S	中S	△C	△C	△C	△C	△C	△C	5
F4	父遼27號	"	1555	101.5	22.5	11	2.8	2.6	中S	中S	△C	△C	△C	△C	△C	△C	0

第2

(2)

多肥栽培二代小雞種第四代以後系統育成試驗成績表

第二期選拔系統群並二單獨系統成績

1) 圓錐觀察

世代	交配組合	系統番号	出穗始期	穗端期	穗端性狀	穗頭期	穗頭性狀	倒伏	病害	備考
F7	母無芒愛國	27系 635-1	8.30	9.1	9.2	3	10.16	44	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	△△△△△△△△△△
	"	-2	8.30	9.1	9.2	3	10.16	44	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	△△△△△△△△△△
	"	-3	8.30	9.1	9.2	3	10.16	44	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	△△△△△△△△△△
	父早稻神力	" -4	8.30	9.1	9.2	3	10.16	44	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	△△△△△△△△△△
	"	-5	8.30	9.1	9.2	3	10.16	44	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	△△△△△△△△△△
F7	平 均	8.30	9.1	9.2	3	10.16	44	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	△△△△△△△△△△	
	"	682-1	8.25	8.30	9.1	7	10.18	47	少中中中中中中中中中	△△△△△△△△△△
	母無芒愛國	" -2	8.28	9.1	9.2	5	10.18	46	中多基基基基基基基基	△△△△△△△△△△
	"	-3	8.28	8.31	9.2	5	10.18	46	中多基基基基基基基基	△△△△△△△△△△
	父穀良都	" -4	8.29	9.1	9.2	4	10.18	46	基中中中中中中中中中	△△△△△△△△△△
F7	"	-5	8.30	9.1	9.2	3	10.18	46	中中中中中中中中中中	△△△△△△△△△△
	平 均	8.28	8.31	9.2	5	10.18	46	2-甚	4	

第 2

第 2

F6	母白鷺	27系 345-1	9.6	9.8	9.9	3	10.20	41	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	少少少少少少少少少少
	"	-2	9.5	9.7	9.8	3	10.20	42	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	少少少少少少少少少少
	"	-3	9.5	9.7	9.8	3	10.20	42	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	少少少少少少少少少少
	父選一	" -4	9.4	9.6	9.7	3	10.20	43	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	少少少少少少少少少少
	"	-5	9.4	9.7	9.8	4	10.20	42	3	4
F6	平 均	9.5	9.7	9.8	3	10.20	42	多-甚	4-少	
	"	738-1	9.4	9.7	9.8	4	10.22	44	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	少少少少少少少少少少
	母白鷺	" -2	9.3	9.7	9.8	5	10.22	44	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	少少少少少少少少少少
	"	-3	9.5	9.7	9.8	3	10.22	44	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	少少少少少少少少少少
	父選一	" -4	9.4	9.6	9.7	3	10.22	45	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	少少少少少少少少少少
F6	"	-5	9.4	9.6	9.7	3	10.22	45	甚甚甚甚甚甚甚甚甚甚	少少少少少少少少少少
	平 均	9.4	9.7	9.8	4	10.22	44	甚		
	"	27系 1211-1	9.5	9.9	9.10	5	10.30	50	多	
	母中稻神力	" -2	9.5	9.9	9.10	5	10.30	50	中	△△△△△
	"	-3	9.5	9.9	9.10	5	10.30	50	多	△△△△△
F5	父須賀一本	" -4	9.5	9.9	9.10	5	10.30	50	多	△△△△△
	"	-5	9.6	9.9	9.10	4	10.30	50	多	△△△△△
	平 均	9.5	9.9	9.10	5	10.30	50	4-多	△△△△△	

在代交配組合		系統番号	出穗始	出穗期	穂端期	穂端日数	成熟期	結實數	倒伏	病害	備考
		27系 1245-1	9.4	9.7	9.8	4	10.28	50	甚	少	
F5	母選一	" -2	9.4	9.7	9.8	4	10.28	50	"	少	
F5	" -3	9.4	9.7	9.8	4	10.28	50	"	少		
	父竹成	" -4	9.4	9.7	9.8	4	10.28	50	"	少	
	" -5	9.5	9.7	9.8	3	10.28	50	"	少		
	平均	9.4	9.7	9.8	4	10.28	50	甚	少-少		
		" 1247-1	9.4	9.7	9.8	4	10.28	50	甚	少	
F5	母選一	" -2	9.5	9.8	9.9	4	10.28	49	"	少	
F5	" -3	9.4	9.8	9.9	5	10.28	49	"	中		
	父竹成	" -4	9.3	9.7	9.8	5	10.28	50	"	少	
	" -5	9.5	9.8	9.9	4	10.28	49	"	少		
	平均	9.4	9.8	9.9	5	10.28	49	甚	少-中		
	母選一	" 1241-2	9.4	9.8	9.9	5	10.22	44	少	多	
F5	" -3	9.5	9.8	9.9	4	10.22	43	少	"		
	父竹成	" -4	9.5	9.8	9.9	4	10.22	43	少	"	
	" -5	9.5	9.8	9.9	4	10.22	43	少	"		
	平均	9.5	9.8	9.9	4	10.22	43	少	多		

第33

第24

母雄町		系統番号	出穗始	出穗期	穂端期	穂端日数	成熟期	結實數	倒伏	病害	備考
F4	母雄町	" -2	9.4	9.6	9.7	3	10.22	44	甚	中	
F4	" -3	9.4	9.6	9.7	3	10.22	45	"	"		
	父園取	" -4	9.4	9.6	9.7	3	10.22	45	"	"	
	" -5	9.4	9.5	9.6	2	10.22	46	多	"		
	平均	9.4	9.6	9.7	3	10.22	45	甚-多	中		
F4	母雄町	" 388-1	8.30	9.2	9.3	4	10.15	42	多	中	
F4	母雄町	" 391-1	9.4	9.6	9.7	3	10.18	41	多	4	
		28系 1407	8.27	8.31	9.1	5	10.14	43	甚	多	
F4	母雄町	" 1408	8.27	9.2	9.3	7	10.14	41	"	中	
F4	" 1409	8.31	9.1	9.3	3	10.14	41	"	中		
	父園取	" 1410	9.1	9.2	9.3	2	10.14	41	"	中	
	" 1411	8.30	9.1	9.2	1	10.14	42	"	中		
	平均	8.29	9.1	9.2	4	10.14	42	甚	中-多		
		" 1412	9.1	9.5	9.6	5	10.19	43	甚	少	
F4	母雄町	" 1413	9.5	9.6	9.7	2	10.19	42	"	少	
F4	" 1414	8.31	9.5	9.6	6	10.19	43	"	多		
	父園取	" 1415	9.5	9.6	9.7	2	10.19	42	多	少	
	" 1416	8.30	9.4	9.5	6	10.19	44	甚	多		
	平均	9.2	9.5	9.6	4	10.19	43	多-甚	少-多		

在代交配組合		系統番号	出穗始立穗期	穗抽期	穗抽日數	成熟期	結實日數	倒伏代	病害	備考
		27' 雜 537-1	9.4	9.7	9.8	4	10.22	44	多	中
F4	母中稻神力	" -2	9.4	9.6	9.7	3	10.22	45	少	4
F4	" -3	9.5	9.7	9.8	3	10.22	44	少	4	
F4	父雄町	" -4	9.5	9.7	9.8	3	10.22	44	少	4
F4	" -5	9.5	9.7	9.8	3	10.22	44	少	4	
	平均		9.5	9.7	9.8	3	10.22	44	4-少	中
F4	母中稻神力	526-1	8.28	8.31	9.1	4	10.18	42	少	4
F4	父雄町	529-1	8.31	9.4	9.5	5	10.20	45	少	4
F4	母中稻神力	1457	9.2	9.6	9.7	5	10.18	41	少	中
F4	母中稻神力	1458	8.31	9.6	9.7	7	10.18	41	少	4
F4	"	1459	8.30	9.4	9.6	7	10.18	42	少	4
F4	父雄町	1460	9.4	9.7	9.9	5	10.18	39	少	4
F4	"	1461	9.2	9.5	9.7	5	10.18	41	少	4
	平均		9.2	9.6	9.7	5	10.18	41	多	中

表 25

在代交配組合		系統番号	出穗始立穗期	穗抽期	穗抽日數	成熟期	結實日數	倒伏代	病害	備考
F4	母穀官都	" -2	8.7	8.13	8.14	7	9.30	47	少	少
F4	" -3	8.11	8.16	8.17	5	9.28	47	少	少	
F4	父愛國	" -4	8.7	8.11	8.12	6	10.2	46	少	少
F4	" -5	8.7	8.14	8.29	22	10.5	37	少	少	
	平均									
F4	母穀良都	1422	9.4	9.8	9.9	5	10.26	47	多	少
F4	" 1423	8.26	9.7	9.8	13	10.26	48	甚	少	
F4	" 1424	8.24	9.7	9.8	15	10.26	48	甚	少	
F4	父愛國	" 1426	8.22	8.29	9.1	10	10.26	55	少	中
	平均									
F4	母竹城	27' 雜 1251-1	9.8	9.9	9.10	2	10.22	42	少	中
F4	" -2	9.8	9.9	9.10	2	10.22	42	少	中	
F4	" -3	9.8	9.9	9.10	2	10.22	42	多	中	
F4	父神力	" -4	9.8	9.9	9.10	2	10.22	42	少	中
F4	" -5	9.8	9.9	9.10	2	10.22	42	甚	中	
	平均		9.8	9.9	9.10	2	10.22	42	少-甚	中

表 26

2) 生育及特性調查

母代 交配組合	系統編號	穗長	穗寬	一穗粒數	株重	莖多毛量	葉多毛量	穗綠	穗細	主形	玄大	心多	眼多	芒不厚	芒尖直	備考	體質	次輪系	穗光入統	備考
		穗長	穗寬	一穗粒數	株重	莖多毛量	葉多毛量	穗綠	穗細	主形	玄大	心多	眼多	芒不厚	芒尖直	備考	體質	次輪系	穗光入統	備考
27系635-7	98C 20C 10	29	2.9	4C				蜜C	難C	中C	小C	4C	4C	4C	4C					
母本	2 101C 20C 10	28	2.8	4C				4 4 6 4	4 4 4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4					
F7	3 100C 20C 11	28	2.5	4C				4 4 6 4	4 4 4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	不良體質	除虫	○	○	
父本精神力	4 101C 21C 9	26	2.9	4C				4 4 6 4	4 4 4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4				小穗少	
	5 101C 21C 9	26	2.9	4C				4 4 6 4	4 4 4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4					
平均	100C 20C 10C	27	2.8	4C				蜜C	難C	中C	小C	4C	4C	4C	4C					
母本	682-1 104C 18C 9	27	3.0	4C				蜜C	難C	中C	4C	4C	4C	4C	4C					
F7	-2 104C 18C 10	26	2.6	4C				4 4 4 4	4 4 4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	5	○			
父本	-3 104C 19C 10	25	2.6	4C				4 4 4 4	4 4 4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4					
父本	-4 108C 18C 11	26	2.4	4C				蜜S	4 4 4 4	4 4 4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4					
	-5 105C 18C 11	24	2.2	4C				4 4 4 4	4 4 4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4					
平均	105C 18C 10S	26	2.6	4C				蜜S	難C	中C	4S	3C	4C	4C	4C					

第 31

第 32

27系748-1 112C 20C 12	17	1.4	4C					中C	難C	中C	長C	中C	4C	4C	4C				
母本	2 113C 20S 13	20	1.5	4C				4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4				
F7	3 115C 21S 16	18	1.1	4C				4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	紅S			
父本	4 112C 20S 16	16	1.1	4C				4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4				
	5 112C 20S 13	26	2.0	4C				4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	5	○		
平均	113C 20S 14S	19	1.4	4C				中C	難C	中C	長C	中C	4C	4C	4C	少S	8S		
母本	938-1 100S 20C 12	24	2.0	4C				中C	難C	中C	中C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	5	○
F7	-2 104S 21S 12	28	2.0	4C				4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4C	少S	8S	
父本	-3 103S 20S 11	22	2.0	4C				4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4C	少S	8S	
父本	-4 103S 21C 11	23	2.1	4C				4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4C	少S	8C	
	-5 106S 21C 13	25	1.9	4C				4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4C	少S	紅S	
平均	103S 21S 12S	24	2.0	4C				中C	難C	中C	中S	4S	4C	4C	4C	少S	紅S		
母本	23系121M 117S 23C 11	28	2.5	4C				4C	易C	中C	1S	中C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	5
F7	2 121S 24C 10	25	2.5	4C				4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	
父本	3 122S 23C 9	25	2.8	4C				4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	
父本	4 118S 22C 10	26	2.6	4C				4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	
	5 118S 23C 9	30	3.3	4C				4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	
平均	119S 23C 10S	27	2.7	4C				中C	易C	中C	中S	中C	中C	中C	中C	中S	4C		

卷之三

34

	27	1397-1	113C	21C	11	22	2.0	繩S	中C	易C	中C	中C	中C	LC	LC	AC	5	0			
	"	-2	113C	21C	10	19	1.9	少S	短S	44	44	44	44	44	44	44	44	0			
	雄	140	114C	21C	10	20	2.0	少S	44	44	44	44	44	44	44	44	44	0			
F4		"	-4	113C	20C	10	20	2.0	少S	44	44	44	44	44	44	33	44	0			
	文	圓	版	"	-5	111C	21S	10	21	2.1	中A	44	44	44	易S	44	44	44	44		
					平均	113C	21S	10C	20	2.0	繩S	短S	中C	易S	中C	中C	4C	少S	LC		
F4	母	雄	雌	"	388-1	112C	23S	7	22	3.1	繩S	中C	難S	中C	長S	中S	3S	4C	4C	5	0
F4	父	圓	版	"	391-1	104C	22C	11	27	2.4	中S	中S	中C	難C	中C	中C	4C	少S	4C	5	0
					28	1407	103C	22C	9	20	2.2	繩S	中C	易C	中C	中C	4C	4C	4C	4C	0
	雄	1408	106C	21C	10	25	2.5	44	44	44	44	44	44	44	44	少S	44	44	0		
F4		"	1409	106S	21C	10	25	2.5	4C	44	44	44	44	44	44	44	44	44	5	0	
	文	圓	長	"	1410	107C	20S	11	25	2.3	4C	44	44	44	44	44	44	44	44	0	
				"	1411	113S	21S	9	19	2.1	繩S	44	44	44	中S	44	44	3S	44	0	
					平均	107S	21S	10S	23	2.3	繩S	中C	難S	中C	中S	4C	3S	4C			
				"	1412	110C	21S	12	25	2.1	繩S	中C	難S	中C	中S	4C	3S	4C			
	雄	1413	111C	22C	11	22	2.0	少S	短S	44	易C	44	44	44	44	44	44	3S	0		
F4		"	1414	110C	21S	12	22	1.8	繩S	44	難S	44	44	44	44	44	44	44	4C		
	文	圓	版	"	1415	110C	22C	12	23	1.9	少S	短S	44	易S	44	44	44	44	44	0	
				"	1416	112C	21C	12	23	2.2	繩S	44	難S	44	44	44	44	44	4C	5	0
					平均	111C	21S	12	24	2.0	繩S	短S	中C	易S	中C	中C	4C	44	44	0	

世代	文組系名	標本號	標長	總數	小頭 稱重	平頭 比重	多 少	性狀 有無	株形 根易	葉形 大	葉狀 米小	心多 白少	根多 白少	莖多 白少	花被 多少	果實 大小	種子 多少	備註	查 考
		27號 5321	21.5	10	2.3	2.3	4C		中C	易C	中C	中S	14C	2.8	中S	4C			
F4	母中瘤神力	" -2	115C	21.5	10	2.3	2.3	4C	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
F4	父雄形	" -3	115C	21.5	10	2.4	2.4	4C	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
F4	父雄形	" -4	109C	21.5	9	2.3	2.6	4S	中S	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
F4	父雄形	" -5	109C	20.5	9	2.3	2.6	4C	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
		平均	111S	21.5	10C	2.3	2.4	4S	中C	易C	中C	中S	14S	2.8	4C				
F4	父中瘤神力	" 526-1	101S	21.5	10	2.2	2.2	3S	中S	4C	4C	中C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	5
F4	母中瘤神力	" 524-1	109C	21C	10	2.5	2.5	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	
		28號 1457	108S	21C	9	2.2	2.4	4C	中C	易C	中C	中C	中C	中C	中C	4C	4C	4C	
		母中瘤神力	" 1458	109S	21C	10	2.4	2.4	3.5S	中S	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
F4	父雄形	" 1459	113S	21C	9	2.4	2.6	4C	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
F4	父雄形	" 1460	113S	21C	10	2.6	2.6	4C	中S	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
		平均	111S	21C	9C	2.4	2.5	4S	中C	易C	中C	中S	14S	2.8	4C				

三

三十六

		27系547	89c	20s	10	18	18	AC	中S	中C	中S	中S	AC	AS	红S
F4	母穀良都	" -2	88s	20s	10	18	18	AC	中S	難S	" "	中S	少S	AS	红S
" -3	90s	22s	9	25	23	少S	中S	難S	" "	中S	" "	中S	" "	中S	" "
父愛國	" -4	87s	21s	10	20	20	AC	中S	中S	中S	中S	中S	AC	AC	" "
" -5	99s	23s	9	31	34	AC	中S	蜜S	難S	" "	中S	" "	中S	" "	10
平均		91s	21s	10	22	24	少S	中S	難S	中S	中S	少S	少S	紅S	
28系1422		119s	21s	10	27	27	少S	蜜S	難S	中C	中S	少S	AC	少S	紅S
F4	母穀良都	" 1423	113s	20s	10	21	21	AC	" "	蜜C	中C	中S	" "	" "	" "
父愛國	" 1424	115s	21s	10	24	24	AC	" "	難S	中C	中S	" "	" "	" "	" "
" 1425	109s	20s	10	19	19	AC	" "	難S	中C	中S	" "	" "	" "	" "	" "
平均		114s	21s	10	23	23	蜜S	蜜S	難S	中C	中S	少S	AC	少S	紅S
28系1254		108c	21s	10	18	18	AC	中C	易C	中C	中C	AC	少S	紅S	
F4	西竹城	" -2	108c	21s	10	20	20	AC	" "	" "	" "	中S	中S	" "	" "
" -3	110c	21s	10	19	19	AC	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
大神力	" -4	111c	22c	10	20	20	AC	" "	" "	" "	" "	" "	" "	中S	紅S
" -5	112c	21s	10	18	18	AC	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
平均		110c	21s	10	19	19	AC	" "	易C	中S	中C	少S	AC	中S	紅S

世代	交配組合	系統番号	穀長	穗數	株重	平穎多	芒長少	粒疏少	脫殼易	細長形	玄太米狀	心白少	腹白少	穗壳色	備考		参考 並決策系 統編入系統	
															逐個數量	總體數量		
		28系1347	102C	20S	10	22	2.2	4C	中C	易C	中C	中S	4C	中S	4C			
F4	母信州	" 1348	103S	20S	11	23	2.1	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C		
		" 1349	103C	21S	11	23	2.1	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	5	0	
	父神力	" 1350	101C	20S	11	20	1.9	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C			
		" 1351	102C	21S	10	17	1.7	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	2.5		
		平均	102S	20S	11C	21	2.0	4C	中C	易C	中C	中S	4C	中S	4C			
F4	母信州	28系1327	109S	20S	10	21	2.1	4C	蜜C	難C	中C	4S	小C	4C	少S	紅C		
		" 1328	111S	21S	11	24	2.2	多S	長S	中S	4C	4C	4C	4C	4C	4C		
		" 1529	101S	20S	11	24	2.2	4C	蜜C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C		
	父愛國	" 1330	103S	21S	11	24	2.2	4C	蜜C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C		
		" 1331	103S	20S	12	24	2.0	4C	蜜C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	8	晚型, 4	
		平均	105S	20S	11S	23	2.1	3S	蜜S	難C	中C	4S	1.8	4C	少S	紅C		
F4	母信州	" 1332	112S	23S	9	28	3.1	4C	蜜S	難C	中C	4C	小C	4C	少S	紅C	5	晚型
		" 1333	113S	21S	11	20	1.9	中S	中S	中S	4C	4C	4C	4C	4C	4C		
		" 1334	120S	22S	9	23	2.6	中S	中S	中S	4C	4C	4C	4C	4C	4C		
	父愛國	" 1335	119S	21S	10	23	2.3	4C	中S	4C	4C	4C	4C	4C	少S	4C	5	0
		" 1336	118S	21S	10	23	2.3	中S	4S	中S	4C	4C	4C	4C	少S	4C		
		平均	116S	22S	10S	23	2.4	4S	中S	中S	難C	中C	4S	1.8	4C	3S		

三
四

=8系	1367	104S	19S	13	B1	2.4	4C	蜜S	雄乙	中C	中S	AC	SIS	AC	5	
母單穎神力	"	1362	97S	19S	13	23	1.8	少S	中S	中S	中S	1.4	1.4	中S	64	
F4	"	1369	111S	21S	13	31	2.4	AC	"	"	"	"	"	少S	64	
父愛國	"	1370	115S	21S	14	30	2.1	少S	短S	"	"	"	"	"	64	
"	1371	100S	20S	11	23	2.2	AC	"	"	中C	"	"	"	"	64	
		平均	105S	20S	13S	28	2.1	少S	中S	雄乙	中C	中S	AC	SIS	AC	
		"	1377	105S	21S	10	27	27	AC	蜜C	雄乙	"	中S	AC	多S 紅C	
母單穎神力	"	1378	108S	21C	10	28	2.8	少S	短S	"	"	"	"	中S	紅S	
F4	"	1379	95S	21S	10	27	27	中S	中S	蜜S	"	"	"	"	少S	
父愛國	"	1380	94S	21S	10	27	2.2	稀S	中S	"	"	"	中C	"	AC	
"	1381	92S	21S	11	25	2.3	稀S	中S	"	"	中S	"	"	中S	紅S	
		平均	100S	21S	10C	27	2.6	少S	中S	蜜S	雄乙	中C	中S	AC	SIS	
		"	1382	106S	21S	10	31	3.1	中C	短C	蜜C	雄乙	中C	少S	AC	5 0
母單穎神力	"	1383	99S	21S	10	31	3.1	稀S	"	"	"	"	中S	"	10	早型 5
F4	"	1384	93S	20S	9	27	3.0	"	"	"	"	"	中C	"	5 0	中型 5
父愛國	"	1385	91S	20S	10	27	2.7	"	"	"	"	"	中S	"	少S	早型 5
"	1386	87S	21S	11	27	2.4	AC	蜜S	"	"	中S	中S	少S	"	"	中型 5
		平均	95S	21S	10S	29	2.9	稀S	短C	蜜S	雄乙	中C	中S	AC	中S	AC

三
三

	28年1517	100c	228	10	23	2.3	4c	中C	難S	中C	中S	中C	4c	中S	4c
	" 1518	107c	228	11	25	2.3	4c	中S	易C	4c	" "	" "	" "	中S	4c
F4	母 F3 528	" 1519	103c	228	10	25	2.5	" "	中S	難C	" "	中S	" "	易C	4c
	" 1520	101c	228	10	23	2.3	" "	中S	難S	" "	" "	中C	" "	中C	4c
	" 1521	99.5	208	10	26	2.6	" "	中S	" "	中S	" "	中S	" "	中S	" "
	平均	102.5	218	10c	24	2.4	4c	中S	難S	中C	中S	中S	4c	中S	4c
	" 1522	101.8	228	9	19	2.1	4c	中S	難S	中C	中S	4c	3c	3c	4c
F4	母 F3 528	" 1523	111.5	235	11	23	2.1	" "	中C	" "	" "	中C	" "	3c	4c
	" 1524	104.8	208	11	25	2.3	" "	中S	" "	" "	中S	" "	3c	4c	
	父晚白通	" 1530	113.5	228	10	26	2.6	" "	中S	難C	" "	" "	" "	3c	4c
	" 1531	98.5	218	12	24	2.0	" "	中S	難C	" "	" "	" "	3c	4c	8
	平均	115.5	228	11.5	23	2.2	4c	中S	難S	中C	中S	4c	3c	4c	

(3)

標準栽培二依ルホ固定系統生産力検定試験成績表

第一年目

昭和三年度

1) 園場観察

系統番号	親品種	母代	出穂始期	出穂期	穂摘期	穂摘日数	成熟期	結實日数	倒伏	病害	蟲害	備考
1	鐵内晚33号	9.5	9.7	9.9	4	10.31	52					
27' 鴻系 932	上州×愛國	F5	8.3	8.6	8.7	4	9.10	34	無	中	少	
" " 984	上州×愛國	"	8.5	8.11	8.12	7	9.14	33	"	少	"	
	陸羽愛國20号		8.13	8.16	8.17	4	9.28	42	"	"	"	
27' 鴻系 995	上州×愛國	F5	8.5	8.8	8.10	5	9.18	39	"	"	中	
" " 554	愛國×福島	F7	8.8	8.14	8.15	7	9.28	44	"	"	"	
	愛國26号		8.16	8.19	8.21	5	10.2	42	"	"	"	
27' 鴻系 565	愛國×福島	F7	8.9	8.15	8.17	8	9.28	42	"	"	"	
" " 509	愛國×細輝坊	"	8.6	8.15	8.19	11	9.28	42	少	"	"	
	愛國第1号		8.15	8.17	8.20	5	9.28	39	無	"	"	
27' 鴻系 958	上州×愛國	F5	8.5	8.11	8.13	8	9.14	32	"	"	"	
	鐵内晚33号		9.5	9.7	9.8	3			"	"	"	
27' 鴻系 942	上州×愛國	F5	8.9	8.13	8.14	5	9.14	31	少	"	"	

表 4

表 4

	澁波	8.7	8.12	8.13	6	9.10	28	無	無			
27' 鴻系 1012	上州×愛國	F5	8.9	8.15	8.16	7	9.20	35	"	少	少	
" " 135	愛國×國富	F10	8.11	8.16	8.17	6	9.24	38	"	少	少	
	早大場		8.10	8.13	8.14	4	9.14	23	"	少	少	
27' 鴻系 164	愛國×國富	F10	8.11	8.14	8.16	5	9.23	38	"	少	少	
" " 332	大場×二合半	F7	8.9	8.14	8.15	6	9.24	40	"	少	少	
	園取		8.11	8.14	8.16	5	9.16	31	"	少	少	
27' 鴻系 325	大場×二合半	F7	8.11	8.14	8.16	5	9.23	42	"	少	少	
" " 372	女澁×大場	F7	8.8	8.13	8.14	6	9.27	44	"	少	少	
	鐵内晚33号		9.5	9.7	8.8	3			"	"	"	
	神力21号		8.27	8.29	8.31	4	10.4	40	無	少	少	
27' 鴻系 720	衣笠早生×新園取	F7	8.20	8.23	8.24	4	10.5	42	中	少	少	
" " 1083	五叶×愛國	F5	8.17	8.21	8.22	5	10.7	46	甚	少	少	
	福神1号		8.29	8.31	9.2	4	10.10	38	中	少	少	
27' 鴻糞 889	早稻神力×穀良都	F4	8.19	8.22	8.23	4	10.6	44	少	少	少	
" " 878	早稻神力×穀良都	"	8.21	8.24	8.25	4	10.7	43	無	中	中	
	早神23号		8.30	8.31	9.2	3	10.18	46	"	少	少	
27' 鴻糞 165	早稻神力×神力	F4	8.23	8.24	8.25	2	10.7	43	"	中	中	
27' 鴻糞 247	晚33号×大場早	F9	8.26	8.29	8.30	4	10.10	41	少	少	少	

系統番号	親品種	母代	出穂始期	出穗期	穀端期	穀端日數	成熟期	穀熟日數	倒伏病害蟲害備考
	早生善光寺白銀 鐵内晚33号		8.24	8.26	8.28	4	10.18	41	無 中 少 少 少 少 少 少 少
27'鴻系 257	晚33号×大場早	F9	8.28	8.29	8.30	2	10.19	41	少 少 少 少 少 少 少 少 少
" " 267	晚33号×大場早	F9	8.26	8.28	8.30	4	10.10	41	少 少 少 少 少 少 少 少 少
	畠量好		8.30	9.1	9.2	3	10.17	45	中 中 中 中 中 中 中 中 中
27'鴻系 495	瘦龜×短穗	F7	8.30	8.31	9.1	2	10.16	45	中 中 中 中 中 中 中 中 中
" " 635	無芒愛國×早稻神力	F7	8.29	8.30	9.1	3	10.16	45	中 中 中 中 中 中 中 中 中
	竹成174号		9.3	9.5	9.6	3	10.17	41	少 少 少 少 少 少 少 少 少
27'鴻系 636	無芒愛國×早稻神力	F7	8.29	8.30	8.31	2	10.17	47	少 少 少 少 少 少 少 少 少
" " 1263	裸一×竹成	F5	8.26	8.28	8.30	4	10.10	41	少 少 少 少 少 少 少 少 少
	澤田2号		8.23	8.25	8.26	3	10.18	43	少 少 少 少 少 少 少 少 少
27'鴻系 277	陶取×荒木	F8	8.29	8.31	9.1	3	10.9	36	少 少 少 少 少 少 少 少 少
	鐵内晚33号		9.6	9.7	9.8	2			少 少 少 少 少 少 少 少 少
27'鴻系 645	無芒愛國×鐵內部	F7	8.27	8.30	8.31	4	10.11	41	少 少 少 少 少 少 少 少 少
	鐵内早生70号		8.17	8.21	8.22	5	10.9	46	少 少 少 少 少 少 少 少 少
27'鴻系 682	無芒愛國×鐵内部		8.26	8.28	8.30	4	10.10	41	少 少 少 少 少 少 少 少 少
" " 816	竹成×荒木	F6	8.30	9.1	9.2	3	10.17	35	少 少 少 少 少 少 少 少 少
	榮神力		9.1	9.3	9.4	3	10.30	56	無 無 無 無 無 無 無 無 無

表 43

27'鴻系 987	竹成×荒木	F6	8.25	8.28	8.30	5	10.6	37	無 中 少 少 少 少 少 少 少
" " 1216	中稻神力×須賀一本	F5	8.30	9.1	9.2	3	10.12	40	無 無 無 無 無 無 無 無 無
	中生神力		8.31	9.2	9.3	3	10.13	44	少 少 少 少 少 少 少 少 少
27'鴻系 918	晚稻神力×竹成	F5	9.2	9.4	9.5	3	10.19	46	中 中 中 中 中 中 中 中 中
" " 853	晚稻神力×竹成	F5	8.30	9.2	9.3	4	10.12	39	無 無 無 無 無 無 無 無 無
	鐵内晚33号		9.5	9.7	9.8	3			少 少 少 少 少 少 少 少 少
	愛知旭		9.4	9.5	9.6	2	10.30	54	無 無 無 無 無 無 無 無 無
27'鴻系 883	晚稻神力×竹成	F5	8.31	9.2	9.3	3	10.10	37	無 無 無 無 無 無 無 無 無
" " 919	晚稻神力×竹成	F5	9.1	9.3	9.4	3	10.23	49	少 少 少 少 少 少 少 少 少
	三法賀旭		9.3	9.5	9.6	3	10.30	54	少 少 少 少 少 少 少 少 少
27'鴻系 157	早稻神力×神力	F4	9.3	9.4	9.5	2	10.23	48	少 少 少 少 少 少 少 少 少
" 鴻系 737	白極×裸一	F6	8.29	9.2	9.3	5	10.15	42	無 無 無 無 無 無 無 無 無
	京旭		9.3	9.5	9.6	3	10.31	55	少 少 少 少 少 少 少 少 少
27'鴻系 745	白極×裸一	F6	9.2	9.5	9.6	4	10.15	39	少 少 少 少 少 少 少 少 少
" " 738	白極×裸一	F6	9.4	9.6	9.7	3	10.25	48	少 少 少 少 少 少 少 少 少
	神力798号		9.4	9.7	9.8	4	10.30	52	無 無 無 無 無 無 無 無 無
	鐵内晚33号		9.5	9.7	9.8	3			少 少 少 少 少 少 少 少 少
27'鴻系 1211	中稻神力×須賀一本	F5	9.4	9.6	9.7	3	10.25	42	無 無 無 無 無 無 無 無 無
" " 1245	裸一×竹成	F5	9.4	9.5	9.6	2	10.19	43	無 無 無 無 無 無 無 無 無

表 44

系統番号	兩親品種	古代	出穗始期	出穗期	穗端期	穗端日數	成熟期	結實日數	倒伏	病害	蟲害	備考
	晚神乃弓		9.5	9.6	9.7	2	10.25	48	無	△	△	
27'鴻系 1247	撰一×竹或	115	9.2	9.3	9.5	3	10.21	46	"	△	△	
" " 1272	撰一×竹或	115	9.1	9.2	9.4	3	10.15	41	"	少△	△	
	愛媛神乃		9.4	9.6	9.7	3	10.25	48	"	△	△	
27'鴻系 1291	撰一×竹或		9.3	9.4	9.5	2	10.10	35	"	△	△	
" " 1296	撰一×竹或	8.30	9.2	9.3	3	10.10	37	"	△	△	△	
	深一本第一号		9.7	9.9	9.10	3	11.3	54	"	△	△	
27'鴻系 1316	撰一×竹或	8.30	9.1	9.2	3	10.9	37	"	△	△	△	

第 45

表 4

2) 生育及粒收量調查

系統番号	兩親品種	古代	稈長	穗長	莖數	穗數	有効莖步合%	反步全收量(貫)	反步全收量(貫)	精穎率	精穎步合	精穎粒數	備考
	畿内晚33号		89	19	14	13	93		138.5				
27'鴻系 932	上州×愛國	115	84	19	13	11	85	238.7	96.0	40	3.65		
" " 984	上州×愛國	115	96	23	8	7	88	238.7	107.3	45	3.89		
	陸羽愛國20号		92	23	11	10	91	262.7	131.3	50	4.76		
27'鴻系 995	上州×愛國	115	104	21	11	10	91	252.6	101.3	40	3.77		
" " 554	豊國×福島	117	96	24	8	7	88	240.7	110.7	49	4.33		
	愛國26号		93	23	10	9	90	238.7	115.3	48	4.15		
27'鴻系 565	豊國×福島	117	94	25	8	6	75	232.0	112.0	48	4.16		
" " 509	豊國×綿禪號	117	104	30	8	7	88	236.7	112.0	47	4.21		
	愛國第1号		92	22	10	9	90	257.3	120.7	48	4.36		
27'鴻系 958	上州×愛國	115	25	20	10	10	100	220.0	100.0	45	3.60		
	畿内晚33号		90	19	13	12	92		136.7				
27'鴻系 942	上州×愛國	115	106	23	10	9	90	236.0	107.3	45	3.82		
	波 波		94	24	11	10	91	226.7	105.3	46	3.83		
27'鴻系 1012	上州×愛國	115	92	21	10	9	90	240.0	112.0	47	4.15		
" " 135	愛國×國高	110	81	19	14	12	93	232.0	105.3	45	3.84		

系統番号	品種	世代	禪長	穗長	基數	穗數	有効基 歩合%	及当全 收量(t)	及当精 穀量(t)	精穀 步合	精穀及 高(%)	備考
	早 大 場		82	22	12	11	92	256.0	114.7	45	4.16	
27鶴系 164	愛國×國富	F10	83	20	15	14	93	228.0	105.3	46	3.57	
" " 332	大場×二合半	F7	81	23	10	10	100	242.7	114.0	47	4.24	
	國 風		93	21	13	12	92	240.0	114.0	48	4.24	
27鶴系 325	大場×二合半	F7	91	23	10	9	90	238.7	111.3	47	4.15	
" " 372	女淡×大場	F7	94	22	12	11	92	260.7	128.0	49	4.69	
	穀内晚33号		92	19	14	14	100		135.5			
	神力21号		101	20	13	13	100	342.7	128.7	38	4.70	
27鶴系 720	衣笠早生×新國風	F7	97	24	10	9	90	276.0	116.0	42	4.53	
" " 1083	上州×愛國	F5	110	24	11	11	100	260.0	112.7	43	4.10	
	福神1号		114	21	12	11	92	369.0	126.0	35	4.74	
27鶴系 889	早稻神力×穀良都	F4	92	22	12	11	92	266.7	112.7	42	4.01	
" " 878	早稻神力×穀良都	F4	95	21	12	11	92	285.3	114.0	40	4.22	
	早神23号		87	20	14	14	100	304.0	120.7	40	4.41	
27鶴系 165	早稻神力×神力	F4	88	22	15	14	93	280.0	110.7	40	3.98	
27鶴系 247	晚33号×大場早	F9	95	20	15	14	93	317.3	126.0	40	4.60	
	早生善光寺白銀		90	22	12	12	100	285.3	112.0	39	4.44	
	穀内晚33号		92	19	16	15	94		132.4			

表 47

27鶴系 2571	晚23号×大場早	F9	93	20	14	14	100	322.7	124.0	38	4.49	
267	晚33号×大場早	F9	94	20	15	15	100	322.7	120.0	37	4.32	
	留量好		90	19	17	16	94	288.0	122.0	42	4.40	
27鶴系 495	愛惠×短穗	F7	134	19	9	9	100	366.0	93.0	25	3.58	
" " 635	無毛愛國×早稻神力	F7	93	20	11	11	100	274.7	120.7	44	4.44	
	竹成174号		98	19	13	12	92	322.7	130.7	41	4.90	
27鶴系 636	無毛愛國×早稻神力	F7	93	20	12	12	100	302.7	135.3	45	4.89	
27鶴系 1263	選一×竹成	F5	93	19	14	13	93	313.3	118.7	38	4.50	
	澤田2号		107	23	9	9	100	252.3	108.7	42	4.13	
27鶴系 277	國風×荒木	F8	104	21	12	11	92	329.3	121.3	37	4.59	
	穀内晚33号		88	19	14	13	93		128.0			
27鶴系 645	無毛愛國×穀良都	F7	108	20	10	9	90	312.0	136.7	44	5.12	
	穀内早生70号		87	22	11	10	91	285.3	122.0	43	4.49	
27鶴系 682	無毛愛國×穀良都	F7	95	19	13	12	92	313.3	122.7	39	4.87	
" " 816	竹成×荒木	F6	92	21	13	13	100	348.0	126.7	36	4.89	
	榮神力		97	19	16	16	100	342.7	140.7	41	5.12	
27鶴系 787	竹成×荒木	F6	82	22	12	11	92	304.0	111.3	37	4.15	
" " 1216	中稻神力×須賀一木	F5	97	21	12	12	100	248.7	123.3	41	4.82	
	中生神力		92	22	14	13	93	302.7	131.3	43	4.85	

表 48

系統番号	御親高祖	古代	禪長	穗長	基數	穗數	有効基 歩合%	反當全 收量(匁)	反當精 穀量(匁)	精 板 歩 合	反當精 穀(石)	備考
27'鴨原 918	晚稻神力×竹成	F5	96	21	13	13	100	328.0	132.7	40	4.69	
" " 253	晚稻神力×竹成 鐵内院33号 愛知旭	F5	94 96 93	21 19 18	13 14 14	12 13 13	92 93 93	324.0 125.8	136.0 136.0	42	5.04 4.98	
27'鴨原 823	晚稻神力×竹成	F5	88	18	14	13	93	282.0	118.0	41	4.44	
" " 919	晚稻神力×竹成 滋賀旭	F5	100	20	12	12	100	345.3	138.0	40	5.13	
27'鴨原 157	早稻神力×神力	F4	91	18	12	12	100	324.0	122.0	38	4.37	
27'鴨原 737	白鷺×選一 京旭	F6	90 95	19 20	13 12	13 11	100 92	322.7 276.0	128.0 141.3	40 38	4.72 4.91	
27'鴨原 745	白鷺×選一	F6	101	20	14	13	93	325.3	122.0	39	4.67	
" " 732	白鷺×選一 神力798号 畿内院33号	F6	101 104 88	20 20 20	14 13 14	14 12 14	100 92 100	345.3 380.0 127.0	136.0 145.3 127.0	39 38 38	5.02 5.21	
27'鴨原 1211	中稻神力×須賀木	F5	109	22	10	10	100	337.3	128.0	38	4.78	
" " 1245	選一×竹成 麗神3号	F5	95 92	19 20	13 13	13 12	100 92	316.0 330.7	134.0 126.0	42 38	5.06 4.62	
1247	選一×竹成	F5	99	19	14	13	93	345.3	144.7	42	5.08	
1272	選一×竹成	F6	96	19	11	11	100	329.3	131.3	40	4.81	

第3											
	愛媛神力		95	19	13	12	92	337.3	136.0	40	4.86
27'鴨原 1291	選一×竹成	F5	80	18	13	13	100	322.7	122.0	38	4.67
" " 1291	選一×竹成 選一本第一号	F5	90 98	17 20	10 15	10 14	100 93	334.7 372.0	126.7 140.7	38	4.69 5.12
27'鴨原 1316	選一×竹成	F5	104	18	10	10	100	354.7	126.7	36	4.62

3.1 收量調查

系統番号	品種	世代	及当去米 重量(實)	及当去米 標準比率	及当去米 標準比率	精米率	每斗米 重量(克)	收穫步合	呂夏	備考
								重量	容量	
	紫內晚33號		115.0	100	8.04	100	280	378	83.0	
27'鴻系 932	上州×愛國	F5	72.8	63	1.93	63	263	377	52.9	下/中
" " 984	上州×愛國	F5	84.0	73	2.23	73	276	377	57.3	中/下
	陸羽愛國20號		106.7	93	2.80	92	276	381	81.3	58.8
27'鴻系 995	上州×愛國	F5	82.2	71	2.16	71	269	381	57.3	下/中
27'鴻系 554	愛國+福島	F7	96.5	84	2.55	84	274	379	81.3	58.9
	愛國26號		95.4	84	2.47	82	278	386	82.7	59.5
27'鴻系 565	愛國×福島	F7	92.8	81	2.44	81	269	379	82.4	58.7
" " 529	愛國×細稻株	F7	92.1	81	2.41	80	266	382	82.2	57.2
	愛國第一號		99.5	88	2.58	86	277	386	82.4	59.2
27'鴻系 958	上州×愛國	F5	81.4	72	2.15	72	278	378	81.4	59.7
	紫內晚33號		113.5	100	3.00	100				
27'鴻系 942	上州×愛國	F5	87.6	77	2.28	76	281	384	81.6	59.7
	汰汰		85.9	76	2.25	75	275	381	81.6	58.7
27'鴻系 1012	上州×愛國	F5	91.1	80	2.35	78	270	387	81.3	58.6
" " 135	愛國×圓富	F10	86.0	96	2.19	93	274	392	81.7	57.0

第5

系統番号	品種	世代	及当去米 重量(實)	及当去米 標準比率	及当去米 標準比率	精米率	每斗米 重量(克)	收穫步合	呂夏	備考
								重量	容量	
	早大場		94.1	83	2.48	83	276	380	82.0	59.6
27'鴻系 164	愛國×圓富	F10	86.7	76	2.19	73	279	392	81.4	58.1
" " 332	大場×二合半	F7	93.3	83	2.48	83	269	376	81.8	58.5
	圓取		92.7	82	2.38	80	269	389	81.3	56.1
27'鴻系 325	大場×二合半	F7	90.8	81	2.39	80	268	380	81.6	57.6
" " 372	大場×大場	F7	105.2	94	2.58	93	273	379	82.2	59.3
	紫內晚33號		112.5	100	2.98	100				
	神代26號		106.6	95	2.81	94	274	379	82.8	59.8
27'鴻系 720	依笠早生大場圓取	F7	95.4	85.2	2.46	83	256	388	82.7	54.3
" " 1083	上州×愛國	F5	93.2	82	2.38	80	275	388	81.8	58.0
	福津15		100.8	90	2.60	87	266	388	80.0	54.9
27'鴻系 884	早稻神功劍頭	F4	92.4	82	2.37	80	281	390	82.0	59.4
" " 878	早稻神功劍頭	F4	93.6	85	2.44	84	270	383	82.1	57.8
	早稻23號		99.6	91	2.59	89	274	385	82.5	58.7
27'鴻系 165	早稻神功×神功	F4	91.7	83	2.37	81	278	387	82.8	59.5
27'鴻系 247	日高3大場早	F4	104.1	95	2.77	95	274	376	82.6	60.2
	早生善光寺		91.4	83	2.38	82	252	384	81.6	53.6
	紫內晚33號		104.9	100	2.91	100				
27'鴻系 253	晚33號×大場早	F9	103.7	94	2.77	95	276	374 + 83.6	61.7	中/上

第5

系統番号	品種名	世代	父当玄米 重量(kg)	全上粒 率	父当玄米 容積比	全上粒種 率	精米 率	玄米一年 生量	粒幅歩合		品質 備考
									重量	容積	
27'鴻系 267	晚33号×大場早 留量好	F9	101.1	92	2.66	91	278	380	84.3	61.6	中上
			102.0	93	2.64	91	277	386	83.6	60.0	中中
27'鴻系 495	愛鬼×短穗	F7	78.2	71	2.14	70	260	384	84.1	57.0	下上
" " 635	無毛愛國×早稻神力	F7	100.6	92	2.57	88	272	392	83.4	57.9	下中
	24成-134号		107.7	101	2.79	99	267	386	82.4	58.9	中上
27'鴻系 636	無毛愛國×早稻神力	F7	113.0	106	2.88	102	276	393	83.5	58.9	下中
" " 1263	選一×竹成	F5	97.2	92	2.52	90	264	385	81.9	56.0	中上
	澤田2号		90.2	85	2.30	82	263	393	83.1	56.0	上中
27'鴻系 277	園取×荒木	F8	99.3	94	2.57	91	264	386	81.7	56.0	中中
	鐵内晚33号		106.2	100	2.81	100					
27'鴻系 645	無毛愛國×散良都	F7	115.0	108	2.99	106	267	385	84.1	58.4	下中
	鐵内早生71号		101.4	96	2.69	96	272	377	83.1	59.9	中上
27'鴻系 682	無毛愛國×散良都	F7	101.8	96	2.60	93	257	392	83.0	54.5	下中
" " 816	竹成×荒木	F6	104.7	99	2.78	99	259	377	82.6	56.9	中中
	菜神力		118.6	112	3.03	108	275	392	84.3	59.2	中上
27'鴻系 787	竹成×荒木	F6	91.8	88	2.36	86	268	389	82.5	56.9	中上
" " 1216	仲稻神力×須賀林	F5	113.1	99	2.63	95	256	392	83.6	54.6	中中
	牛生神力		109.8	105	2.80	101	271	392	83.6	57.7	中中

第 53

系統番号	品種名	世代	父当玄米 重量(kg)	全上粒 率	父当玄米 容積比	全上粒種 率	精米 率	玄米一年 生量	粒幅歩合		品質 備考
									重量	容積	
27'鴻系 918	晚稻神力×竹成	F5	110.8	106	2.83	103	283	392	83.5	60.3	中上
" " 253	晚稻神力×竹成	F5	112.6	108	2.90	105	270	388	82.8	57.5	中中
	鐵内晚33号		104.4	100	2.76	100					
	愛知旭		111.7	107	2.94	107	273	386	82.1	59.0	上中
27'鴻系 823	晚稻神力×竹成	F5	96.2	92	2.57	91	266	384	81.5	56.5	下上
27' " 919	晚稻神力×竹成	F5	113.0	108	2.96	107	269	382	81.9	57.7	中上
	滋賀旭		114.4	110	3.03	110	275	377	82.5	60.4	上中
27'鴻系 157	早稻神力×神力	F4	101.6	97	2.68	97	279	379	83.3	61.3	中上
27'鴻系 737	白進×選一	F6	105.9	100	2.79	100	271	379	82.7	59.1	中上
	京旭		117.6	111	3.02	108	288	384	83.2	61.5	上中
27'鴻系 745	白進×選一	F6	106.5	100	2.82	101	274	378	83.2	60.4	上中
" " 738	白進×選一	F6	113.3	107	2.97	106	271	382	83.3	59.2	上中
	神力798号		119.4	113	3.08	110	279	388	82.2	59.1	中上
	鐵内晚33号		106.0	100	2.80	100					
27'鴻系 1211	仲稻神力×須賀林	F5	104.2	98	2.65	95	268	393	81.4	55.4	中上
" " 1245	選一×竹成	F5	108.3	102	2.78	99	265	390	80.8	54.4	上中
	晚神3号		102.8	97	2.66	95	273	386	81.6	57.6	中上
27'鴻系 1247	選一×竹成	F5	116.4	110	2.99	107	285	391	81.8	58.9	上中
" " 1272	選一×竹成	F5	105.7	100	2.82	97	273	389	80.5	56.5	中上

第 54

系統番号	兩親品種	世代	及当玄米 重量(kg)	全生育期		天當玄米 容量石	全生育期 澤比率	精穀一千 重量公石	玄米一千 重量公石	板櫈歩合		呂質備考
				洋比率	澤比率					重量	容量	
27'鴻系 1291	愛媛神力	111.2	105	2.87	1.03	280	3.88	81.8	59.1	中上		
" " 1296	選一×竹成	F5	98.6	93	2.56	91	261	385	80.8	54.8	上下	
	選一×竹成	F5	102.4	97	2.72	97	270	377	80.8	58.0	中上	
	源一本第一号		114.7	108	3.03	108	275	378	81.5	59.2		
27'鴻系 1316	選一×竹成	F5	102.4	97	2.72	97	274	376	80.8	58.9	中上	

第 55

表 56

(4)

多肥栽培二依九未固完系穀生產力検定試驗成績表

第一年目 昭和三年度

II 園場觀察

系統番号	兩親品種	世代	出穗始期	拔穗期	穗端日數	成熟期	結實日數	倒伏	病害	蟲害	備考	
											少	多
	畿内晚33号		9.7	9.9	9.10	3						4
27'鴻系 932	上洲×愛國	F5	8.3	8.7	8.9	6	9.19	41	△	△	△	△
" " 984	上洲×愛國	F5	8.6	8.11	8.12	6	9.21	40	△	△	△	△
	薩羽愛國20号		8.13	8.16	8.18	5	9.29	42	少	△	△	△
27'鴻系 995	上洲×愛國	F5	8.5	8.9	8.10	5	9.26	47	中	△	△	△
" " 554	愛國×福島	F7	8.8	8.14	8.16	8	9.30	45	少	△	△	△
	愛國26号		8.15	8.19	8.20	5	10.3	44	中	△	△	△
27'鴻系 565	愛國×福島	F7	8.9	8.12	8.15	6	10.2	48	多	△	△	△
" " 529	愛國×細稈抗虫	F7	8.8	8.14	8.16	8	9.30	45	少	△	△	△
	愛國第1号		8.14	8.18	8.20	6	9.30	41	少	△	△	△
27'鴻系 938	上洲×愛國	F5	8.5	8.12	8.14	4	9.29	46	△	△	△	△
	畿内晚33号		9.3	9.9	9.10	3						△
27'鴻系 742	上洲×愛國	F5	8.8	8.18	8.15	7	9.29	45	△	△	△	△

系統番号	両親品種	品代	出穂始	出穂期	穂揃期	穂揃日数	成熟期	結實日数	倒伏	病害	蟲害	備考
	淀 稲	8.9	8.12	8.14	5	9.19	36	甚	少	少	少	
271鶴系 1012	上州×愛國	F5	8.10	8.14	8.16	6	9.25	40	少	少	少	
" " 135	愛國×国富	F10	8.12	8.16	8.17	5	9.25	39	少	少	少	
	早 大 湯		8.10	8.13	8.14	4	9.20	37	少	少	少	
271鶴系 164	愛國×国富	F10	8.12	8.15	8.17	5	9.20	42	少	少	少	
" " 332	大湯×三合半	F7	8.12	8.14	8.16	3	9.25	45	多	少	少	
	国 取		8.12	8.14	8.16	3	9.26	41	中	少	少	
271鶴系 325	大湯×三合半	F7	8.12	8.14	8.15	3	9.25	41	多	少	少	
" " 372	如法×大湯	F7	8.9	8.13	8.14	5	9.25	42	甚	少	少	
	穀内晚33号		9.7	9.9	9.10	3						
	神力21号		8.30	9.1	9.2	3	10.15	43	多	中	少	
271鶴系 720	衣笠学生×新園取	F7	8.23	8.24	8.25	2	10.7	43	甚	少	少	
" " 1083	上州×愛國	F5	8.19	8.21	8.23	4	10.10	48	甚	少	少	
	福神1号		8.31	9.3	9.4	4	10.19	45	甚	甚	甚	
271鶴系 889	早稻神力×穀良部	F4	8.19	8.22	8.23	4	10.8	46	多	甚	甚	
" " 878	早稻神力×穀良部	F4	8.24	8.28	8.29	5	10.9	41	多	甚	甚	
	早神23号		9.2	9.4	9.5	3	10.19	44	多	甚	甚	
271鶴系 165	早稻神力×神力	F4	8.23	8.26	8.27	4	10.8	42	多	甚	甚	

吉谷

271鶴系	247	晚33号×大湯早	F9	8.29	8.31	9.1	3	10.12	41	甚	少	少
" "		早生善光寺白銀		8.26	8.29	8.30	4	10.10	41	甚	多	少
" "		穀内晚33号		8.7	9.8	9.11	4			少	少	少
271鶴系	257	晚33号×大湯早	F9	8.28	8.31	9.1	4	10.11	40	甚	少	少
" "	267	晚33号×大湯早	F9	8.28	8.31	9.1	4	10.11	40	甚	少	少
		洛 壯 好		9.1	9.4	9.5	4	10.19	44	多	少	少
271鶴系	495	愛 魁 × 短穂	F7	8.31	9.4	9.5	5	10.19	44	少	少	少
" "	635	無毛愛國×早稻神力	F7	8.31	9.1	9.2	2	10.20	48	甚	少	少
		竹城174号		9.4	9.8	9.9	5	10.19	40	甚	甚	甚
271鶴系	636	無毛愛國×早稻神力	F7	8.31	9.2	9.3	3	10.18	45	甚	少	少
" "	1263	櫻一八竹城	F5	8.28	8.31	9.1	4	10.12	41	甚	甚	甚
		津田2号		8.23	8.27	8.29	6	10.11	43	甚	甚	甚
271鶴系	277	國取×荒木	F8	8.31	9.2	9.4	4	10.9	35	甚	甚	甚
" "		穀内晚33号		8.7	9.9	9.11	4					
271鶴系	645	無毛愛國×穀良部	F7	8.30	9.1	9.2	3	10.17	45	甚	少	少
" "		穀内早生70号		8.18	8.21	8.22	4	10.9	42	甚	甚	中
271鶴系	682	無毛愛國×穀良部	F7	8.27	9.2	9.3	7	10.16	40	多	少	少
" "	816	竹城×荒木	F6	9.1	9.4	9.5	4	10.9	34	多	中	少
		繁 神 力		9.3	9.7	9.8	5	10.30	52	多	少	少

系統番号	兩親品種	古代出穂始出穂期	穂抽期	穗滿期	成熟期	结实數	倒伏	病害	蟲害	備考
27 鴻糸 287	竹成×荒木	F6 8.26	8.30	9.1	6	10.9	32	多	甚	4
" 1216	中福神力×須賀本	F5 8.31	9.4	9.5	5	10.17	42	甚	多	4
	中福神力	9.1	9.4	9.5	4	10.16	41	甚	甚	4
27 鴻糸 918	鶴縮神力×竹成	F5 9.3	9.7	9.8	5	10.19	41	甚	少	4
" " 253	鶴縮神力×竹成	F5 9.1	9.5	9.6	5	10.14	38	甚	少	4
	鶴内 晚33号	9.7	9.10	9.11	4					4
	愛媛知旭	9.5	9.7	9.8	3	10.80	52	甚	少	4
27 鴻糸 583	鶴縮神力×竹成	F5 9.2	9.5	9.6	4	10.13	37	甚	中	4
" 914	鶴縮神力×竹成	F5 9.3	9.6	9.8	5	10.18	40	多	多	4
	三益賀旭	9.5	9.8	9.9	4	10.80	51	多	甚	4
27 鴻糸 157	早縮神力×神力	F4 9.5	9.7	9.8	3	10.30	52	甚	甚	4
27 鴻糸 737	白姫×櫻一	F6 8.30	9.3	9.6	7	10.16	40	甚	多	4
	高旭	9.5	9.8	9.9	4	11.1	53	u	中	4
27 鴻糸 245	白姫×櫻一	F6 9.4	9.7	9.8	4	10.30	52	u	少	4
" 738	白姫×櫻一	F6 9.5	9.8	9.9	4	10.30	51	u	少	4
	神力 798号	9.5	9.8	9.9	4	11.3	55	u	少	4
	鶴内 晚33号	9.7	9.9	9.11	4					4
27 鴻糸 1211	中福神力×須賀本	F5 9.5	9.7	9.9	4	10.30	51	甚	少	4

27 鴻糸 1245	櫻一×竹成	F5 9.5	9.7	9.9	4	10.30	57	甚	中	4
	鶴神3号	9.5	9.7	9.8	3	10.30	52	u	少	4
27 鴻糸 1247	櫻一×竹成	F5 9.4	9.7	9.8	4	10.16	38	多	甚	4
" 1272	櫻一×竹成	F5 9.2	9.5	9.6	4	10.17	41	多	甚	4
	愛媛神力	9.6	9.8	9.9	3	10.30	57	中	多	4
27 鴻糸 1291	櫻一×竹成	F5 9.4	9.7	9.8	4	10.15	37	中	多	4
" 1296	櫻一×竹成	F5 9.2	9.5	9.6	4	10.16	40	少	少	4
	須一本第一号	9.9	9.11	9.13	4	11.3	51	少	少	4
27 鴻糸 1316	櫻一×竹成	F5 9.2	9.4	9.5	3	10.14	39	少	少	4

2) 生育及粗收量調查

系統番号	品種名稱	品種	穗長	穗長	穗數	穗數	有効莖 率%	反當全 收量(kg)	反當精 收量(kg)	精 收量(kg)	精 收量(kg)	備考
	蘇內晚33號	F5	95	21	16	15	94		126.0			
27'鶴系	上州×愛國	F5	86	21	15	14	93	245.3	90.7	37		
" "	上州×愛國	F5	99	23	11	10	91	223.3	121.3	44		
	陸羽愛國26號	F6	96	23	18	12	92	232.0	127.3	42		
27'鶴系	上州×愛國	F5	108	22	13	12	92	313.7	132.9	42		
" "	愛國×福島	F7	99	24	11	10	91	289.3	133.3	46		
	愛國26號	F4	94	23	18	12	92	233.3	122.0	45		
27'鶴系	豐國×福島	F7	98	25	12	11	92	289.3	132.0	46		
" "	豐國×細柳莊	F7	102	29	9	8	78	263.3	118.7	45		
	愛國第1號	F9	89	22	18	11	85	265.3	115.3	44		
27'鶴系	上州×愛國	F5	82	21	16	15	94	276.0	122.0	44		
	蘇內晚33號	F3	93	21	15	14	93		154.2			
27'鶴系	上州×愛國	F5	106	24	14	13	93	285.3	121.0	44		
	波浪	F9	99	24	15	14	93	265.3	118.0	45		
27'鶴系	上州×愛國	F5	96	22	12	12	100	274.0	124.7	46		
" "	愛國×國富	F10	89	21	19	18	95	280.0	127.3	45		

第 6

55

	早大場	F1	81	23	15	14	93	270.7	118.7	44		
27'鶴系	愛國×國富	F10	85	20	18	17	94	282.7	130.7	46		
" "	大場×二合字	F7	84	24	15	14	93	265.3	128.0	48		
	周取	F2	92	22	15	14	93	298.7	136.7	46		
27'鶴系	大場×二合字	F7	95	24	14	13	93	258.7	115.3	45		
" "	女浪×大場	F7	99	22	15	14	93	298.7	130.7	44		
	蘇內晚33號	F6	96	21	17	15	88		110.8			
	神力21號	F8	108	21	13	12	92	337.3	96.7	29		
27'鶴系	衣笠半兵×新國富	F4	100	25	10	10	100	266.7	93.3	35		
" "	上州×愛國	F5	115	24	13	12	92	296.7	102.7	35		
	福祿1號	F6	116	22	13	12	92	340.6	104.7	31		
27'鶴雜	早稻神力×穀良郎	F4	96	23	15	14	93	265.3	53.3	20		
" "	早稻神力×穀良郎	F4	108	20	14	14	100	304.7	36.7	10		
	早神23號	F3	93	21	16	15	94	312.0	52.0	17		
27'鶴雜	早稻神力×神力	F4	93	23	16	15	94	324.0	52.0	16		
27'鶴系	晚33號×大場早	F9	102	20	16	15	94	328.0	73.3	22		
	早生善光寺白銀	F6	96	23	12	12	100	324.0	72.7	23		
	蘇內晚33號	F1	101	21	19	17	89		91.7			
27'鶴系	晚33號×大場早	F9	103	21	16	15	94	341.3	84.7	25		

系號番号	原親品種	世代	株長	穗長	莖數	穗數	有効茎 反芻全 反芻精 精穀			備考
							步合	收量(貫)	收量(貫)	
27'鴻系	267 晚33号×大場早	F9	104	21	18	16	89	346.7	22.0	24
	谷量好		93	21	18	17	94	331.3	76.7	23
27'鴻系	495 愛兔×短穗	F7	136	19	9	8	89	363.3	165.3	32
" "	635 無芒愛國×早稻神力	F7	98	21	13	13	100	298.7	95.3	32
	竹成 144号		102	20	17	15	88	332.3	65.3	19
27'鴻系	636 無芒愛國×早稻神力	F7	100	21	14	13	93	297.3	90.0	30
" "	1263 櫻一×竹成	F5	97	20	15	13	87	324.3	75.3	23
	澤田 2号		113	23	12	11	92	308.0	60.7	20
27'鴻系	277 開取×荒木	F8	115	22	14	13	93	344.0	28.0	8
	穀內晚33号		98	20	18	17	94		57.1	
27'鴻系	645 無芒愛國×穀良友	F7	121	21	14	13	93	318.7	92.0	30
	穀內早生70号		93	23	16	14	88	270.7	92.0	34
27'鴻系	682 無芒愛國×穀良友	F7	105	19	16	16	100	313.3	79.3	25
" "	816 竹成×荒木	F6	90	23	14	13	93	354.7	67.3	19
	采神力		101	21	18	16	89	322.7	81.3	25
27'鴻系	787 竹成×荒木	F6	82	21	16	15	94	311.3	60.0	21
" "	1216 中稻神力×須賀一本	F5	108	21	15	14	93	336.0	64.0	19
	中安神力		97	20	17	15	88	302.7	38.7	13

63
64

27'鴻系	918 晚稻神力×竹成	F5	95	21	16	15	94	358.7	65.3	18
" "	853 晚稻神力×竹成	F5	93	22	16	14	88	312.0	85.3	27
	穀內晚33号		98	20	19	18	95		83.5	
	愛知旭		92	19	16	14	88	349.2	108.0	31
27'鴻系	883 晚稻神力×竹成	F5	87	19	17	16	94	324.0	92.0	28
" "	919 晚稻神力×竹成	F5	100	21	16	14	88	354.5	74.1	21
	益賀旭		106	20	16	16	100	307.3	54.7	18
27'鴻系	157 早稻神力×神力	F4	107	20	18	16	89	310.0	40.0	13
27'鴻系	737 白鷺×櫻一	F6	96	21	18	16	89	336.0	68.0	20
	京旭		105	21	16	15	94	332.0	73.0	22
27'鴻系	746 白鷺×櫻一	F6	97	20	20	18	90	325.3	71.3	22
" "	738 白鷺×櫻一	F6	106	20	18	17	94	333.3	82.0	25
	神力798号		111	20	17	15	88	333.3	70.0	21
	穀內晚33号		98	21	18	18	100		78.5	
27'鴻系	1211 中稻神力×須賀一本	F5	104	23	13	12	92	366.7	86.7	24
" "	1245 櫻一×竹成	F5	103	20	17	16	94	345.3	102.0	30
	晚神力号		91	21	16	15	94	322.7	94.0	29
27'鴻系	1247 櫻一×竹成	F5	102	21	17	15	88	337.3	106.7	32
" "	1272 櫻一×竹成	F5	92	18	12	11	92	332.0	70.7	21

系統番号	品種名	母代	禪長	穗長	茎數	穗數	有効率	収量(袋)	及石精	精量	精歩合	備考
	愛媛神力		99	20	16	15	94	322.7	66.7	21		
27'鴻系 1291	櫻一×竹内	F5	89	19	18	16	89	345.3	96.7	28		
" 1296	櫻一×竹成	F5	95	19	15	13	87	322.0	102.0	31		
	通一本第一号		99	21	16	14	88	382.7	111.3	29		
27'鴻系 1316	櫻一×竹内	F5	103	20	13	12	92	377.3	135.3	36		

55

56

3.) 収量調査

系統番号	品種名	母代	及石玄米 薰量(噸)	企上糾標 薰比率	企上玄米 容量(石)	企上糾標 薰比率	精吸一千 薰量(石)	精吸一千 薰量(石)	収量	精歩合	備考
	畿内晚33号		106.1	100	280	100	269	379	84.2		
27'鴻系 932	上州×愛國	F5	73.0	69	188	67	257	388	80.5	55.3	
" 934	上州×愛國	F5	100.3	95	259	93	275	388	82.7	58.7	
	陸羽愛國25号		106.4	100	271	97	271	392	83.6	57.6	
27'鴻系 945	上州×愛國	F5	108.4	102	279	100	263	388	81.6	55.2	
" 554	愛國×福島	F2	111.3	105	290	103	268	384	83.5	58.3	
	愛國26号		101.9	79	265	77	266	385	83.5	59.7	
27'鴻系 565	愛國×福島	F2	110.1	85	284	83	264	387	83.4	56.8	
" 569	愛國×細得坊主	F2	97.1	75	252	74	261	385	81.8	55.4	
	愛國第一号		97.0	75	247	72	258	393	84.1	55.3	
27'鴻系 958	上州×愛國	F5	98.6	76	253	74	271	390	80.8	56.2	
	畿内晚33号		129.8	100	342	100	—	—	—	—	
27'鴻系 942	上州×愛國	F5	103.6	80	265	77	265	391	82.2	55.5	
	温 浸		95.2	83	253	74	260	377	80.7	55.7	
27'鴻系 1412	上州×愛國	F5	101.8	78	260	76	263	392	81.6	54.9	
" 135	愛國×國富	F10	105.3	81	266	78	266	396	82.7	55.5	

系統番号	品種	世代	及当玄米 重量(kg)	全粒率		精粉一千 重量(g)	玄米一千 重量(g)	収量	摺歩合 重量	客量	備考
				溝比率	容積(ml)						
27鴻系	早大場		98.2	86	2.58	75	263	381	82.7	57.3	
	愛國×國富	F10	108.1	116	2.75	112	273	393	82.7	57.4	
	大場×三合半	F2	105.1	113	2.77	113	258	380	82.1	55.8	
27鴻系	圓取		113.5	122	2.91	118	262	390	83.0	55.7	
	大場×三合半	F2	98.9	101	2.43	101	257	378	81.4	55.2	
	女流×大場	F7	108.0	116	2.81	114	261	386	82.6	56.1	
27鴻系	畿内晚33号		93.3	100	2.64	100					
	神力21号		80.2	86	2.07	84	262	388	82.9	56.1	
	衣笠早生×新開取	F7	77.5	83	2.01	82	248	386	83.1	53.2	
27鴻系	上洲×愛國	F5	86.2	92	2.23	91	264	387	83.9	57.3	
	福神1号		84.1	90	2.15	87	254	391	80.8	52.4	
	早稻神力×穀良穀	F4	43.4	47	1.10	45	261	393	81.5	53.9	
27鴻系	878 早稻神力×穀良穀	F4	29.9	39	0.80	39	253	374	81.6	55.2	
	早神23号		42.6	55	1.09	53	252	392	81.9	52.9	
	早稻神力1号	F4	42.7	55	1.18	55	259	379	82.2	56.2	
27鴻系	165 早稻神力入神力	F4	42.7	55	1.18	55	259	379	82.2	56.2	
	247 晚33号×大場早	F9	60.3	78	1.60	78	252	379	82.3	55.0	
	早生善光寺白銀		58.5	76	1.51	74	236	387	80.4	49.0	
27鴻系	畿内晚33号		73.2	100	2.04	100					

56

58

27鴻系	257 晚33号×大場早	F9	70.1	91	1.90	93	257	369	82.8	57.6	
	267 晚33号×大場早	F9	66.2	86	1.78	87	253	371	80.7	54.9	
	器量好		62.9	81	1.62	79	251	388	82.0	52.9	
27鴻系	495 愛蜜×短穂	F7	87.6	113	2.33	114	265	376	83.2	58.7	
	635 無芒愛國×早稻神力	F7	29.4	103	2.08	102	260	382	83.8	56.7	
	竹成174号		52.7	110	1.38	108	258	381	80.7	54.5	
27鴻系	636 無芒愛國×早稻神力	F7	74.6	165	1.95	153	261	383	82.9	56.5	
	1263 櫻一×竹成	F5	60.8	126	1.60	126	248	380	80.7	52.6	
	澤田2号		49.0	102	1.30	102	243	376	80.8	52.0	
27鴻系	277 圓取×荒木	F8	21.7	45	--	--	235	--	77.5	--	
	畿内晚33号		48.1	100	1.27	100					
	645 無芒愛國×穀良穀	F7	78.6	163	2.09	164	251	376	85.4	56.9	
27鴻系	畿内早生70号		27.9	162	2.07	163	258	377	84.7	57.7	
	682 無芒愛國×穀良穀	F7	66.8	139	1.92	135	242	388	84.2	52.4	
	816 竹成×荒木	F6	56.5	117	1.54	121	254	368	84.0	58.1	
27鴻系	榮神力		69.4	144	1.82	143	253	381	85.4	53.7	
	787 竹成×荒木	F6	32.9	75	1.40	76	265	378	82.6	55.6	
	1216 中稻神力×須賀木	F5	53.7	76	1.41	76	241	381	83.7	53.0	
	中生神力		32.0	45	0.85	46	245	375	82.8	53.8	

系統番号	兩親品種	母代	及当玄米	全上耕標	及当玄米	全上耕標	精耕一升	玄米一升	粒摺步合	備考
			重量(石)	準比率	重量(石)	準比率	重量(石)	重量(石)	重量(石)	
27鴨系	918 晚稻神力×竹成	F5	54.1	7.2	1.42	7.7	2.53	3.82	82.8	55.0
" "	853 晚稻神力×竹成	F5	70.2	1.00	1.87	10.1	2.54	3.76	82.3	55.6
	畿内晚33号		70.3	1.00	1.85	100	—	—	—	—
	愛知旭		90.2	1.28	2.36	128	2.56	3.83	83.5	55.9
27鴨系	883 晚稻神力×竹成	F5	76.2	1.08	1.98	107	2.48	3.85	82.8	53.4
" "	919 晚稻神力×竹成	F5	61.4	87	1.58	85	2.45	3.88	82.8	52.3
	滋賀旭		45.2	64	1.18	64	2.49	3.84	82.6	53.6
27鴨種	157 早稻神力×神力	F4	33.2	47	0.87	47	2.50	3.82	83.1	54.4
27鴨系	737 白蓮×櫻一	F6	56.1	85	1.47	84	2.49	3.82	82.5	53.8
	京旭		61.9	94	1.60	92	2.60	3.87	84.8	56.9
27鴨系	745 白蓮×櫻一	F6	58.7	89	1.55	89	2.49	3.79	82.3	54.2
" "	738 白蓮×櫻一	F6	68.0	103	1.74	100	2.54	3.91	82.9	53.9
	神力夕98号		58.2	88	1.50	86	2.50	3.89	83.2	53.6
	畿内晚33号		66.1	100	1.74	100	—	—	—	—
27鴨系	1211 晚稻神力×須賀一本	F5	71.5	108	1.81	104	2.46	3.94	82.5	51.4
" "	1245 櫻一×竹成	F5	84.2	127	2.12	122	2.50	3.98	82.5	53.3
	晚神3号		75.4	114	1.92	110	2.52	3.92	80.2	51.5
27鴨系	1247 櫻一×竹成	F5	87.9	133	2.24	129	2.52	3.92	82.4	53.0
該 69										
該 70										
27鴨系	1272 櫻一×竹成	F5	57.1	86	1.50	86	2.54	3.80	80.8	54.0
	愛媛神力		54.4	82	1.41	81	2.48	3.87	81.5	52.4
27鴨系	1291 櫻一×竹成	F5	79.0	120	2.03	117	2.55	3.89	81.7	53.6
" "	1296 櫻一×竹成	F5	84.0	127	2.16	124	2.55	3.88	82.4	54.0
	深味卯八号		92.9	141	2.43	140	2.61	3.83	83.5	56.9
27鴨系	1316 櫻一×竹成	F5	111.5	169	0.87	165	2.68	3.89	82.4	56.9

備考 未固定系統生産力検定試験地力標準品種

及当精耕重量 / 變異係数

品種名	一區面積	比例及正數			合計
		A	B	C	
畿内晚33号	2 布	?	?	?	21

	標準栽培	多肥栽培
A, B, C, 合計21區二就手計算	6.4%	30.0%
A, B, C, 1各相當24.1号3區手合併之1區手	6.4%	31.0%
合計子區二就手計算	6.4%	31.0%

57 成績表 [IV] 耐病性交配用品種選定試驗成績表 昭和三年度

甲區多肥栽培

品種番号	品種名	供試株數	出穗始期	穗長期	穗長數	倒伏	病害	蟲害	備考
1	千葉錦石2号	2	8.13	8.15	8.18	5	少	少	7% 無 0
2	東洋錦	"	8.12	8.15	8.16	4	"	無	10 少 0
3	高麗津	"	8.6	8.12	8.13	7	"	" 13	無 0
4	高麗子	"	8.13	8.18	8.20	7	中	" 14	" 0
5	女波	"	8.10	8.13	8.15	5	"	" 1	" 0
6	龍羽132号	"	8.11	8.14	8.17	4	"	少	1 " 5
7	龍羽20号	"	8.13	8.17	8.18	5	"	無	1 " 15
8	愛玉1号	"	8.17	8.20	8.21	4	多	中	0 " 0
9	無苦愛玉	"	8.17	8.18	8.19	2	"	無	3 " 10
10	坊主玉川	"	8.17	8.19	8.20	3	"	中	2 " 0
11	新石白	"	8.18	8.21	8.22	4	甚	" 0	" "
12	義光寺	"	8.19	8.22	8.22	4	"	無	0 少 "
13	義畿内22号	"	8.17	8.19	8.22	5	"	中	1 " "
14	玉錦	"	8.25	8.28	8.29	4	"	無	0 少 5
15	銀坊主	"	8.23	8.26	8.30	7	"	"	無 5
16	穀良都	"	8.18	8.21	8.21	3	"	中	4 " 0
17	穀坊玉	"	8.22	8.24	8.28	3	"	無	0 " 10
18	日德	"	8.26	8.27	8.28	2	"	少	0 " 5
19	郡益	"	8.26	8.29	8.30	4	"	無	3 " 0
20	穗浦	"	8.26	8.29	8.30	4	"	" 0	" 0
21	石山祖	"	8.28	8.31	9.1	4	"	1	少 0
									吸 21 71
									吐 22
22	撲一崎山号	2	8.30	8.31	9.1	2	甚	無	0 少 0
23	改良神力	"	9.2	9.4	9.5	3	"	" 6	無 0
24	伊勢錦22号	"	9.3	9.4	9.6	3	"	" 0	" 0
25	愛知署量好	"	9.3	9.5	9.6	3	"	" 5	中 0
26	万作	"	9.3	9.5	9.6	3	"	" 0	無 0
27	改良千本	"	9.2	9.4	9.5	3	多	" 0	" 0
28	都1号	"	9.3	9.4	9.5	2	"	中	0 少 0
29	蓮波	"	9.2	9.4	9.5	3	甚	無	0 " 0
30	新嘜	"	8.31	9.4	9.5	5	多	" 8	無 0
31	清稻	"	9.2	9.5	9.6	4	甚	" 3	" 0
32	中生病不知	"	9.4	9.5	9.6	2	"	中	2 " 0
33	奈良中神1号	"	9.1	9.3	9.4	3	"	少	2 " 0
34	三河弓錦	"	9.2	8.8	9.5	3	"	無	0 " 0
35	大山不着	"	9.3	9.5	9.6	3	"	" 2	" 0
36	神力	"	9.3	9.5	9.6	3	"	" 1	" 0
37	近江錦	"	9.2	9.3	9.4	2	多	" 2	" 0
38	播磨錦	"	9.3	9.5	9.6	3	"	" 2	" 0
39	大分赤慶1号	"	8.30	9.4	9.5	6	"	" 2	" 0
40	倭稻	"	9.3	9.4	9.5	2	"	" 2	" 0
41	畿文56号	"	9.4	9.6	9.8	3	"	" 3	多 0
42	天和錦	"	9.5	9.7	9.8	3	"	" 2	中 0
43	倒木	"	9.6	9.8	9.9	3	中	" 1	多 0
44	荒木	"	9.5	9.8	9.9	4	少	" 0	無 0
45	畿内剛力	"	9.5	9.8	9.9	4	"	" 6	中 0
46	逆后晚生	"	9.4	9.7	9.8	4	多	" 1	中 0
47	白玉	"	9.5	9.8	9.9	4	"	" 1	" 0

品種番号	品種名	供試年	出穂始	実穂期	穂前期	穂端日数	倒伏	病害	晩霜	蟲害	備考
48	相模	2	9.5	9.8	9.9	4	多	中	1%	中	0%
49	熊本坊主	4	9.5	9.7	9.8	3	多	少	1	△	0
50	三旭	n	9.6	9.7	9.8	3	甚	中	2	△	0
51	愛媛牛生強	n	9.5	9.7	9.8	3	多	少	1	△	0
52	山北坊主	n	9.6	9.8	9.9	3	多	少	20	△	0
53	東日本	n	9.5	9.8	9.9	4	中	少	1	△	0
54	岡山田山選1号	n	9.6	9.8	9.9	3	多	△	1	△	0
55	道海神力	2	9.7	9.8	9.9	2	多	△	3	△	0
56	小天狗	n	9.7	9.9	9.11	4	中	△	3	△	0
57	須賀一本	n	9.7	9.9	9.10	3	多	少	5	△	0
58	曲玉	n	9.8	9.10	9.12	4	甚	△	5	△	0
59	丸葉	n	9.11	9.13	9.14	3	少	△	1	△	0
60	伊豫仙人3号	n	9.8	9.12	9.13	5	少	△	1	△	0
61	牛之助	n	9.10	9.13	9.15	5	少	△	0	△	0
62	西寧48号	n	9.11	9.14	9.15	4	少	△	0	△	0
63	九月8号	n	9.11	9.13	9.14	3	少	△	1	△	0
64	前津	1	8.13	8.15	8.17	4	多	△	1	△	10
65	赤穂神力	4	9.7	9.8	9.9	2	中	少	3	△	0
66	馬乘神力	n	9.7	9.8	9.9	2	少	△	6	△	0
67	櫻早生	n	9.3	9.5	9.6	3	甚	△	1	△	0
68	福神	n	9.2	9.4	9.5	3	少	中	1	△	0
69	有閑	n	8.9	8.12	8.13	4	少	中	0	△	0
70	新潟紅穂	n	9.6	9.8	9.9	3	多	△	1	△	0
71	福島毛子	n	8.13	8.17	8.18	5	甚	少	1	△	0
72	新潟早生	n	8.6	8.11	8.12	6	少	少	0	△	0

岐 23

岐 24

73	新八号	1	8.13	8.17	8.18	5	甚	少	0	△	0
74	上嶺コボレ	n	8.5	8.7	8.9	4	少	多	0	△	0
75	銀秀2号	3	8.16	8.19	8.20	4	少	多	0	△	0
76	北部2号	4	9.6	9.7	9.8	2	少	△	1	△	0
77	大正毛子	n	8.11	8.17	8.18	7	甚	△	0	△	0
78	白珍子	n	9.4	9.6	9.7	3	多	△	1	△	0
79	川根2号	n	8.25	8.27	8.29	4	中	△	1	△	0
80	白早生石1号	n	8.12	8.13	8.15	3	中	△	0	△	0
81	赤見石1号	3	8.6	8.11	8.12	6	甚	多	0	△	0
82	長者穂	n	9.4	9.7	9.9	5	多	△	1	△	0
83	信州毛子	n	8.13	8.16	8.17	4	甚	△	0	△	0
84	愛媛神力強	n	9.6	9.8	9.9	3	多	△	6	△	0
85	五石	3	9.4	9.5	9.6	2	少	△	0	△	0
86	早生剛力	n	8.23	8.25	8.27	4	中	△	3	△	0
87	越前1号	n	8.4	8.9	8.10	6	少	中	0	△	0
88	銀洋1号	n	8.12	8.14	8.15	3	多	△	0	△	0
89	改江改石	n	8.21	8.24	8.25	4	少	少	0	△	0
90	早熟坊主1号	n	8.8	8.11	8.12	4	△	△	0	△	0
91	肉山	n	8.4	8.7	8.9	5	△	△	0	△	0
92	白川	n	8.8	8.11	8.12	4	△	△	1	△	0
93	一人娘	n	8.16	8.18	8.19	3	△	△	2	△	0
94	改良大吉	n	8.28	8.30	8.31	3	多	△	10	△	0
95	中性神力4号	n	9.2	9.3	9.4	2	少	△	1	△	0
96	改良改良	n	8.19	8.22	8.23	4	甚	少	0	△	0
97	野山田穂2号	3	9.2	9.3	9.4	2	少	△	5	△	0
98	三浦可喜郎	n	9.3	9.5	9.6	3	少	△	3	△	0

品種番号	品種名	供試株数	出穂始期	穂期	穂の大きさ	倒伏	病害	備考
99	相川四四四	1	9.9	9.10	9.11	3	多無	1無0
100	獅子不喰	"	8.18	8.20	8.21	3	甚多	3"0
101	刺160号	"	9.6	9.9	9.10	4	少無	3"0
102	興音選	"	9.12	9.14	9.15	3	中	4"0
103	伊豫相模13	"	9.5	9.7	9.8	3	多	"0"0
104	伊豫仙石4号	"	9.5	9.11	9.12	2	少	"2"0
105	神力374号	"	9.6	9.9	9.10	4	多	"10"0
106	中着15	"	8.23	8.26	8.27	4	甚	中5"0
107	近江5号	"	8.19	8.23	8.24	5	甚	少6"0
108	不作不知崎7号	"	9.1	9.3	9.4	3	甚	無4"0
109	稻木早生	"	8.2	8.4	8.6	4	少	0"0
110	金比羅	"	9.2	9.4	9.5	3	"	12無0
111	木曾錦	"	9.2	9.4	9.6	4	"	6"0
112	庄兵五	"	9.9	9.11	9.12	3	"	4"0
113	仙石5号	"	9.11	9.13	9.14	3	"	1"0
114	早大内3号	"	9.3	9.4	9.5	2	"	5"0
115	小神力	"	9.6	9.8	9.9	3	"	1"0
116	白牛本	"	9.6	9.9	9.10	4	少	7"0
117	仲好	"	9.4	9.6	9.7	3	少	2"0
118	滋賀園取	"	9.7	9.9	9.10	3	"	無1"0
119	歌捷	"	8.9	8.14	8.16	2	"	0甚80
120	158号	"	9.4	9.5	9.6	2	"	41中0
121	神力22号	"	9.6	9.8	9.9	3	少	1少0
122	日出19号	"	9.2	9.9	9.10	3	"	無2無0
123	壽28号	"	9.6	9.8	9.9	3	少	6"0

四支 25

品種番号	品種名	供試株数	出穂始期	穂期	穂の大きさ	倒伏	病害	備考
124	三寶16号	1	9.8	9.10	9.11	3	甚	少4無0
125	長光寺	"	9.5	9.8	9.9	4	少	36"0
126	敷島	"	8.7	8.11	8.12	5	多	0"0
127	中生愛八	"	8.16	8.18	8.19	3	少	0"0
128	龜尾	"	8.12	8.14	8.15	3	少	無2"0
129	八号	"	8.14	8.17	8.18	4	少	4"0
130	福山	"	8.28	8.31	9.1	4	少	45"0
131	早生愛2号	"	8.29	8.2	8.3	5	少	中0"0
132	農元1号	"	8.9	8.12	8.15	6	少	無0"0
133	浅農後3号	"	8.7	8.11	8.12	5	少	41"0
134	早生大野15	"	8.8	8.12	8.14	6	少	少0"0
135	早生神力1号	"	8.22	8.25	8.26	4	少	4"0
136	旭1号	"	9.7	9.9	9.10	3	少	42"0
137	丹後中稻	"	8.28	8.30	8.31	3	少	0"0
138	曙131号	"	9.13	9.15	9.16	3	少	0"0
139	農穂1号	"	9.13	9.15	9.16	3	少	1"0
140	鶴内早22号	"	8.23	8.25	8.26	3	少	40"0
141	演コホレ	"	9.13	9.15	9.16	3	少	2"0
142	富士	"	9.13	9.15	9.16	3	少	0"0
143	三保	"	9.10	9.11	9.12	2	少	1"0
144	小太1号	"	8.13	8.16	8.19	6	少	1"0
145	武藏	"	8.28	8.31	9.1	4	少	2"0

四支 26

備考 穗首稻熱病八金穂數二対スル罹病穂數歩合ナリ(20株調査)

薺核病八金株數二対スル罹病株數歩合ナリ(20株調査)

(2) 生育調査

品種番号	品種名	供試株數	稈長cm	穗長cm	茎数	穗数	有効基部	一株全重	一株穂重	平均穂重	標準歩合	備考
1	千葉錦2号	2	79	24	14	13	93%	41g	22g	2.4g	54%	
2	車 鄉	"	87	22	16	16	100	62	33	2.1	53	
3	高 深	"	98	26	10	10	100	52	27	2.8	51	
4	お こ	"	94	23	17	16	94	56	31	2.0	54	
5	お と	"	102	25	11	10	91	54	30	3.6	58	
6	陸羽132号	"	103	23	15	14	93	55	30	2.4	55	
7	陸羽20号	"	97	24	12	12	100	57	32	2.9	56	
8	愛 1号	"	106	23	12	11	92	62	34	3.1	58	
9	大 芽 2	"	91	22	14	14	100	57	27	2.1	52	
10	坊 主 川	"	109	26	14	14	100	58	26	2.1	46	
11	射 石 白	"	98	27	17	16	94	57	28	2.0	49	
12	善 光 寺	"	124	27	8	8	100	61	31	4.3	50	
13	綾 内 22号	"	107	25	12	12	100	47	23	2.1	49	
14	王 郡	"	125	21	12	12	100	61	29	2.5	47	
15	銀 坊 主	"	106	22	12	12	100	64	28	2.5	44	
16	穀 良 郡	"	112	25	12	11	92	49	23	2.4	42	
17	綾 坊 主	"	133	25	9	8	89	58	26	3.2	45	
18	122 植	"	126	22	12	12	100	61	27	2.1	44	
19	102 番	"	127	24	11	10	91	61	27	2.6	44	
20	穂 挑	"	130	23	11	10	91	62	27	3.2	44	
21	22 山 祖	"	116	23	13	12	92	62	26	3.2	42	
22	穂 一 時 一 号	"	121	21	13	13	100	52	20	1.6	38	
23	改良神力	"	118	22	13	12	92	50	18	1.5	36	

22

24	神勢錦722号	2	136	23	12	11	92	50	17	1.7	34	28
25	新知星量2号	"	103	22	18	16	89	53	18	1.1	34	
26	万 作	"	127	22	15	14	93	68	27	2.0	39	
27	改良子本	"	133	23	12	11	92	63	27	2.6	43	
28	122 1号	"	123	23	13	12	92	63	27	2.5	42	
29	選 汎	"	124	22	10	10	100	52	22	2.3	42	
30	柿 咳	"	127	22	14	12	86	60	28	2.0	31	
31	清 稲	"	126	21	12	11	92	64	24	2.4	37	
32	中生病不知	"	129	24	11	11	100	62	25	2.4	40	
33	改良中神1号	"	100	21	16	16	100	71	31	2.0	44	
34	三 沢 郡	"	103	20	12	11	92	61	29	1.3	47	
35	天 上 不 翳	"	109	21	13	18	100	66	30	2.5	46	
36	神 力	"	109	21	13	13	100	63	29	2.3	45	
37	122 恵錦	"	127	22	10	10	100	69	29	2.9	42	
38	清慶錦	"	103	20	12	12	100	69	31	2.7	45	
39	火 分 年 庆 1号	"	112	22	12	12	100	67	30	2.5	44	
40	條 稲	"	123	23	10	9	90	59	24	2.6	40	
41	畿文56号	"	98	20	14	13	93					
42	大 和 錦	"	122	21	12	12	100	66	28	1.8	42	
43	倒 十	"	100	21	12	12	100	61	29	2.4	47	
44	荒 木	"	115	23	12	11	92	72	30	2.9	42	
45	畿内剛力	"	98	20	16	15	94	80	34	2.3	43	
46	道后晚生	"	94	22	13	13	100	73	32	2.3	44	
47	白 玉	"	115	22	13	12	92	79	34	2.7	43	
48	相 植	"	109	22	15	15	100	76	30	2.0	40	
49	徳本坊主	"	125	23	12	12	100	68	26	2.4	38	

28

品種番号	品種名	供試羊数	綱長	横長	星数	標数	有効基準	1株重	一根總重	平均複数	備考
50	京旭	2	103	20	15	15	100	77	32	2.2	41
51	愛媛牛牛郎	4	106	21	15	14	93	72	32	2.2	45
52	山北坊主	"	107	20	16	15	94				
53	虹白	4	103	21	17	16	94	79	33	2.2	42
54	田山田吉1号	4	114	22	14	14	100	67	27	2.2	40
55	道海神力	"	102	21	13	13	100	74	30	2.3	41
56	小天狗	3	111	21	16	15	94	77	30	2.1	39
57	欲賀一本	"	108	22	17	15	88	65	22	1.6	34
58	曲玉	"	116	23	15	14	93	54	13	1.4	24
59	牛牛	4	134	23	9	8	89	55	14	1.6	26
60	伊豫仙友3号	"	108	22	17	16	94	79	22	1.8	34
61	千足	4	114	24	11	11	100	80	23	2.1	29
62	西宝48号	"	110	21	14	13	93	81	31	2.3	38
63	九郎8号	"	106	22	16	16	100	73	21	1.7	29
64	前深	1	94	26	12	12	100	57	27	2.3	48
65	赤穂神力	"	109	21	16	15	94	68	28	2.0	42
66	馬乘神力	"	111	21	15	14	93	79	31	2.3	39
67	櫻早生	"	125	24	15	14	93	60	23	1.7	38
68	福神	4	117	22	13	12	92	58	23	2.1	39
69	有岡	"	112	25	11	11	100	42	21	2.1	50
70	新江戸穂	"	109	21	16	15	94	83	35	2.2	42
71	梅香子	3	96	29	12	12	100	60	33	2.8	55
72	森田早生	"	83	20	20	19	95	44	22	1.3	57
73	新1号	4	102	22	12	11	92	27	12	2.3	45
74	山旅コホレ	"	82	23	17	15	88	44	20	1.4	46

48 29

										吸	30
75	奥33.2号	1	92	22	13	12	92	48	26	2.4	55
76	业教2号	4	108	23	13	12	92	82	38	2.8	48
77	火口童子	"	105	22	14	14	100	66	36	2.7	54
78	白玲子	6	94	19	19	17	89	69	33	1.8	48
79	小腹3号	"	103	23	10	10	100	63	26	3.1	42
80	白早生石1号	"	82	22	15	14	93	55	29	1.9	52
81	赤見出石1号	"	82	24	13	12	92	46	24	2.1	49
82	長布穂	"	122	23	11	10	91	77	33	3.2	43
83	信承童子	"	84	23	16	15	94	54	29	2.4	54
84	愛媛神力強	"	94	19	16	14	88	88	34	2.1	39
85	五尺2号	"	102	20	14	13	93				
86	早生剛力	"	87	22	16	15	94				
87	藍前1号	"	101	24	8	8	100	47	27	32	32
88	銀革1号	"	108	25	12	11	92	47	25	2.4	53
89	改良慶元	"	96	23	12	11	92	64	35	2.8	54
90	早坊主1号	"	93	25	11	11	100	49	24	2.3	49
91	肉山	"	102	25	9	9	100	45	23	3.3	53
92	白	"	84	20	16	16	100	51	26	1.6	51
93	一人娘	"	69	19	17	16	94	58	28	2.2	50
94	改良大坊	"	98	22	12	11	92	56	30	1.8	53
95	中生神力4号	"	107	21	17	16	94	65	30	1.9	46
96	改良穀良2号	"	104	24	12	11	92	48	21	2.2	44
97	新山田穂2号	"	112	20	11	10	91	73	34	3.2	46
98	三河錦	"	99	20	13	12	92	61	25	2.1	41
99	相川四1四	"	120	24	11	11	100	78	27	2.6	35
100	獅子不口食	"	97	22	13	12	92	47	24	2.3	52

品種番号	品種名	供試年	稈長	穗長	基數	穗數	有効茎率	株重	一株穂重	平均穂重	穗重歩合	備考
101	金子	160号	1	87	20	15	15	100	76	30	2.1	39
102	吉選	7	108	23	14	13	93	62	33	2.8	53	
103	伊豫相佐1号	6	106	20	14	13	93	69	24	1.7	35	
104	伊豫仙石4号	3	109	24	10	10	100	81	29	3.1	36	
105	神力374号	7	107	21	16	16	100	68	23	2.6	34	
106	印着1号	3	98	24	16	15	94	52	26	1.8	45	
107	近江5号	6	99	23	16	15	94	42	1.7	1.3	36	
108	不作不知2号	6	110	21	16	14	88	60	24	1.8	39	
109	杉木早生	1	101	25	9	7	78	36	17	3.0	48	
110	金比羅	7	126	24	12	12	100	58	22	2.2	37	
111	木曾錦	7	123	22	10	10	100	55	20	2.4	32	
112	伝兵卫	4	118	23	18	16	89	71	20	1.4	28	
113	仙石5号	6	107	21	18	16	89	84	26	1.7	31	
114	早大閑3号	7	101	21	15	14	94	58	23	1.7	41	
115	小神力	3	81	21	17	12	100	72	28	1.8	40	
116	白千本	4	91	18	21	19	90	70	28	1.5	40	
117	仲好	6	101	20	12	12	100	62	25	1.3	40	
118	滋賀園取	4	106	23	15	13	87	69	30	2.2	43	
119	單穂	4	97	24	11	10	91	45	24	2.2	54	
120	158号	5	126	22	14	13	93	60	22	1.8	38	
121	神力22号	6	104	20	19	17	89	60	21	1.3	36	
122	日出19号	4	118	22	16	15	94	59	20	1.4	33	
123	壽23号	6	104	21	16	13	81	64	23	1.6	36	
124	三宝16号	4	111	22	16	15	94	74	30	2.1	40	
125	善光寺	7	118	23	16	14	88	60	16	1.1	26	

岐 31

品種番号	品種名	供試年	稈長	穗長	基數	穗數	有効茎率	株重	一株穂重	平均穂重	穗重歩合	備考
126	敷島	1	88	22	13	11	85	40	21	2.2	51	
127	中生愛2号	7	91	24	14	13	93	54	30	2.4	55	
128	電尾	7	106	24	12	11	92	60	31	2.7	52	
129	人	4	100	22	12	11	92	46	25	2.6	55	
130	福山	6	101	20	15	14	93	65	28	2.0	43	
131	早生愛2号	6	77	20	9	8	89	36	18	2.4	50	
132	雲玉1号	4	105	24	11	11	100	55	28	2.9	51	
133	波農3号	7	94	23	14	12	86	50	24	2.0	49	
134	早生大野1号	7	91	24	10	9	90	57	30	3.3	52	
135	早生神力1号	4	83	23	15	14	93	70	35	2.4	50	
136	旭1号	7	100	21	15	14	93	81	34	2.5	42	
137	日後中稻	4	96	20	17	15	88	56	32	2.0	42	
138	鶴131号	6	115	22	16	15	94	82	28	1.9	34	
139	豊穂1号	7	106	22	14	12	86	87	31	2.2	36	
140	畿内早22号	6	94	22	13	13	100	53	30	2.2	53	
141	赤コホリ	6	110	19	19	17	89	56	32	1.7	52	
142	寄士	4	98	21	18	16	89	92	30	1.7	33	
143	三保	7	104	20	19	18	95	76	34	2.0	44	
144	不文1号	4	93	23	13	12	92	37	26	2.3	51	
145	武藏	3	97	20	18	16	89	69	32	2.0	47	

岐 32

標準品種早神23号(15區)

	稈長	穗長	基數	穗數	一株全重	一株穂重	平均穂重	穂重歩合
平均	94	22	16	15	65	29	2.1	45
25%	53	3.7	85	75	80	24.0	22.0	13.0

成績表 [V] 耐病性交配用品種選定試験成績表 昭和三年度

乙區 標淮栽培 (1) 園場觀察

品種號	品種名	供試年數	出穗始期	穗長	穗粒數	抽穗期	结实數	倒伏	病害	蟲害	偏傷
1	千葉錦石2号	2	8.15	8.16	8.8	3	9.20	43	無	無	
2	東鳴神御	"	8.12	8.14	8.16	4	9.19	34	少	"	
3	鳴高津子	"	8.6	8.10	8.11	5	9.20	40	無	"	
4	金童子	"	8.12	8.14	8.16	4	9.25	40	多	"	
5	女波	"	8.10	8.13	8.14	4	9.26	43	少	"	
6	陸羽132号	"	8.11	8.14	8.16	5	9.27	32	少	"	
7	陸羽26号	"	8.15	8.16	8.17	2	9.27	41	無	"	
8	愛玉1号	"	8.15	8.19	8.20	5	9.29	40	"	"	
9	志若愛玉	"	8.14	8.17	8.19	5	9.29	41	"	"	
10	坊主玉川	"	8.18	8.20	8.21	3	9.30	40	中	"	
11	新石白	"	8.20	8.22	8.23	3	9.30	38	多	"	
12	善光寺	"	8.20	8.22	8.23	3	10.5	43	無	"	
13	畿内22号	"	8.16	8.19	8.20	4	10.15	46	"	"	
14	玉錦	"	8.26	8.28	8.29	3	10.13	45	"	"	
15	銀坊主	"	8.24	8.29	8.30	6	10.7	38	"	"	
16	穀衣紹	"	8.19	8.21	8.22	3	10.3	42	"	"	
17	鶴坊主	"	8.27	8.29	8.30	3	10.11	42	少	"	
18	172	"	8.25	8.28	8.29	4	10.11	43	無	"	
19	忍2益	"	8.27	8.30	8.31	4	10.11	41	"	"	
20	穂浦	"	8.26	8.28	8.29	3	10.15	42	多	"	
21	忍山祖	"	8.26	8.28	8.29	3	10.12	44	無	"	
									吸	33	
									吸	34	
22	櫻一號八号	2	8.27	8.30	8.31	4	10.10	40	多	無	
23	改良神力	"	8.30	9.1	9.2	3	10.12	40	少	"	
24	初勢錦722号	"	9.2	9.4	9.5	3	10.13	38	"	"	
25	愛知畠量好	"	9.2	9.4	9.5	3	10.18	39	"	"	
26	万作	"	9.2	9.4	9.5	3	10.14	39	多	"	
27	改良千本	"	8.31	9.2	9.3	3	10.12	39	"	"	
28	忍1号	"	9.2	9.4	9.5	3	10.14	39	中	"	
29	龜治	"	9.1	9.2	9.4	3	10.14	40	少	"	
30	布清	"	8.30	9.2	9.3	4	10.12	39	無	"	
31	清福	"	9.2	9.4	9.5	3	10.18	43	少	"	
32	中生病不知	"	9.3	9.4	9.5	2	10.20	45	無	少	
33	奈良中神1号	"	8.31	9.2	9.3	3	10.18	45	"	無	
34	三河錦	"	9.1	9.3	9.4	3	10.18	44	"	無	
35	大土不着	"	9.2	9.3	9.4	2	10.18	44	"	"	
36	神力	"	9.2	9.4	9.5	3	10.20	45	中	少	
37	172 海錦	"	9.1	9.2	9.4	3	10.18	44	少	無	
38	播磨錦	"	9.2	9.4	9.6	4	10.20	44	無	"	
39	大分赤慶1号	"	9.2	9.4	9.5	3	10.20	45	少	"	
40	倭紹	"	9.1	9.3	9.4	3	10.18	44	多	"	
41	畿文中56号	"	9.3	9.5	9.6	3	10.21	45	無	少	
42	大和錦	"	9.5	9.6	9.7	2	10.21	44	少	無	
43	倒十	"	9.5	9.7	9.8	3	10.18	42	無	"	
44	荒木	"	9.5	9.6	9.7	2	10.20	43	"	"	
45	畿内剛力	"	9.5	9.6	9.7	2	10.22	45	"	"	
46	道后晚生	"	9.5	9.6	9.7	4	10.29	50	"	少	
47	白玉	"	9.5	9.6	9.7	2	10.20	43	"	無	

品種番号	品種名	供試年数	出穂期	穂期	穗長	株高	倒伏	病害	蟲害	備考
48	柏	2	9.4	9.7	9.9	5	10.30	51	無	無
49	熊本坊主	4	9.5	9.7	9.8	3	10.22	44	少	少
50	五九日	4	9.5	9.8	9.9	4	11.2	54	少	少
51	愛媛神力	1	9.2	9.6	9.8	5	10.21	44	少	少
52	山北坊主	4	9.5	9.7	9.9	4	10.22	43	少	多
53	喜2	4	9.4	9.7	9.9	5	10.22	43	少	少
54	圓山田出雲1号	4	9.4	9.6	9.9	5	10.23	44	少	無
55	道海神力	4	9.5	9.7	9.9	4	11.1	53	少	少
56	小矢狗	4	9.6	9.9	9.10	4	11.1	52	少	少
57	須賀一本	4	9.5	9.8	9.9	4	10.20	44	少	多
58	田玉	4	9.7	9.9	9.10	3	11.1	52	少	少
59	牛先	4	9.9	9.11	9.12	2	11.3	52	少	無
60	伊豫仙友3号	4	9.10	9.11	9.12	2	11.10	59	少	少
61	牛王	4	9.9	9.11	9.12	3	11.10	59	少	少
62	西室48号	4	9.9	9.11	9.14	5	11.10	58	少	少
63	丸井玉號	4	9.6	9.11	9.13	8	11.10	58	少	少
64	前洋	1	8.9	8.14	8.15	6	9.26	42	少	少
65	赤穂神力	4	9.5	9.7	9.8	3	10.22	44	少	少
66	馬鹿神力	4	9.5	9.7	9.8	3	10.22	44	少	無
67	櫻早生	4	9.1	9.5	9.6	5	10.21	45	甚	少
68	福神	4	8.31	9.4	9.5	5	10.20	45	少	少
69	有田	4	8.10	8.11	8.12	2	9.20	39	少	少
70	新田石穂	4	9.5	9.8	9.9	4	10.31	52	無	少
71	福島玉子	4	8.13	8.15	8.16	3	10.17	52	少	少
72	木田早生	4	8.16	8.16	8.17	5	9.21	41	少	少

4枝 35

4枝 36

73	新1号	1	8.12	8.11	8.18	4	9.28	41	少	無
74	上総コル	4	8.9	8.8	8.10	5	9.20	41	少	少
75	興和2号	4	8.16	8.17	8.19	3	10.14	46	無	少
76	北坂2号	4	9.5	9.7	9.8	3	10.31	53	少	無
77	火石玉子	4	8.13	8.16	8.18	5	9.30	43	少	少
78	白珍子	4	9.4	9.6	9.7	3	10.14	49	甚	少
79	川艘3号	4	8.22	8.28	8.29	2	10.10	42	少	少
80	白早生石1号	4	8.9	8.13	8.15	6	9.26	42	無	少
81	赤見出石1号	4	8.7	8.11	8.12	5	9.28	43	少	少
82	長者穂	4	9.5	9.6	9.7	2	10.27	50	少	中
83	信州玉子	4	8.16	8.17	8.18	2	9.30	43	少	無
84	愛媛神力強	4	9.5	9.7	9.8	3	10.28	50	少	少
85	五石2	4	9.3	9.4	9.6	3	10.27	51	無	無
86	豆生岡1号	4	8.22	8.25	8.26	4	10.10	45	少	少
87	越前1号	4	8.5	8.10	8.11	6	9.24	44	少	無
88	銀葉1号	4	8.13	8.14	8.15	2	10.15	51	少	少
89	改良寒風	4	8.18	8.24	8.25	2	10.15	41	少	少
90	早坊主1号	4	8.7	8.9	8.10	3	9.20	41	少	少
91	鶴山	4	8.3	8.5	8.7	4	9.20	44	少	少
92	白川	4	8.7	8.10	8.11	4	9.26	46	少	少
93	一人娘	4	8.16	8.18	8.20	4	9.25	38	無	多
94	改良大坊	4	8.28	8.30	8.31	3	10.11	41	少	無
95	中生神力4号	4	8.31	9.2	9.3	3	10.24	48	少	少
96	改良穀良苗	4	8.19	8.21	8.22	3	10.15	44	甚	少
97	新山田穂2号	4	9.2	9.4	9.5	3	10.14	39	少	少
98	三河錦	4	9.3	9.4	9.5	2	10.20	45	無	少

品種番号	品種名	開花期	始花期	終花期	果熟期	果熟期	成熟期	結果日数	収穫日数	倒伏	病害	異常	備考
99	相川四四〇	1	8.8	9.10	9.11	2	11.10	60	少	無			
100	獅子不鳴	"	8.17	8.21	8.22	5	10.12	41	無				
101	金165号	"	9.7	9.9	9.10	3	11.2	53	無	少			
102	與吉選	"	9.11	9.13	9.14	3	11.10	57	少	無			
103	伊豫相佐1号	"	9.7	9.9	9.10	3	11.10	61	少	無			
104	伊豫仙友4号	"	9.10	9.13	9.14	4	11.15	62	少	無			
105	神力374号	"	9.7	9.9	9.10	3	11.2	53	少	少			
106	中着1号	"	8.17	8.28	8.29	2	10.19	41	無	無			
107	近江5号	"	8.19	8.23	8.25	6	10.15	41	少	少			
108	不作不知夕号	"	9.3	9.4	9.5	2	10.13	38	少	少			
109	杉木早生	"	8.31	8.4	8.6	6	9.18	43	少	少			
110	金比羅	"	9.1	9.3	9.4	3	10.13	58	多	少			
111	木曾錦	"	9.2	9.4	9.5	3	10.31	58	少	少			
112	庄兵五	"	9.7	9.10	9.11	4	11.10	60	少	少			
113	仙友5号	"	9.9	9.12	9.13	4	11.10	58	少	無			
114	早大園3号	"	9.1	9.4	9.5	4	10.11	46	中	少			
115	小神力	"	9.4	9.8	9.9	5	10.29	50	無	無			
116	白千本	"	9.6	9.8	9.9	3	11.1	53	少	少			
117	仲好	"	9.2	9.4	9.6	4	10.20	44	無	少			
118	滋賀園取	"	9.6	9.8	9.9	3	10.30	57	少	少			
119	黒一捷	"	8.10	8.14	8.15	5	9.27	43	無	少			
120	158号	"	8.13	9.3	9.4	4	10.17	45	中	少			
121	神力22号	"	9.4	9.7	9.8	4	10.31	53	少	少			
122	日出19号	"	9.6	9.8	9.9	3	10.21	42	無	少			
123	森23号	"	9.5	9.7	9.8	3	10.19	41	少	少			

124	三発16号	4	9.2	9.8	9.9	2	10.21	42	少	無			
125	喜元寺	"	9.4	9.5	9.6	2	10.31	55	少	少			
126	敷山	"	8.8	8.10	8.12	4	9.16	35	無	多			
127	中生愛風	"	8.14	8.17	8.18	4	9.25	38	少	無			
128	富尾	"	8.13	8.14	8.16	3	9.27	42	少	少			
129	ノイ子	"	8.14	8.17	8.19	5	10.12	54	少	少			
130	福山	"	8.29	8.30	8.31	2	10.18	48	少	少			
131	早生愛不2号	"	7.31	8.2	8.4	4	9.19	46	少	少			
132	豊子1号	"	8.10	8.14	8.16	6	10.2	47	無	無			
133	波瀬後3号	"	8.7	8.11	8.12	5	9.27	38	少	少			
134	早生大野1号	"	8.5	8.8	8.10	5	9.22	44	無	少			
135	中生神力1号	"	8.21	8.23	8.24	3	10.6	43	少	少			
136	九四1号	"	9.5	9.6	9.7	2	10.26	44	多	少			
137	取後中福	"	8.24	8.27	8.28	4	10.2	45	少	少			
138	日陽131号	"	9.10	9.12	9.13	3	10.25	63	少	少			
139	豊穂1号	"	9.11	9.13	9.14	2	10.10	52	少	少			
140	畿内早22号	"	8.18	8.22	8.24	8	10.5	42	少	少			
141	赤コホレ	"	9.13	9.14	9.15	2	10.10	56	少	少			
142	富士	"	9.13	9.14	9.15	2	10.15	61	少	無			
143	三俳	"	9.8	9.10	9.12	4	10.4	53	少	少			
144	十丈1号	"	8.15	8.17	8.19	4	8.28	40	無	中			
145	武藏	"	8.30	8.31	9.1	2	10.15	44	多	無			

(2) 病害調査

品種番号	品種名	供試株数	株高	根長	茎数	穗数	有効茎率	一株全重	一株穂重	平均穂重	穗重	備考
1	千葉錦石2号	2	54	24	14	14	100	20	27	1.9	34	
2	高砂錦	"	84	21	14	13	93	29	29	1.8	32	
3	高砂錦	"	94	25	9	9	100	72	26	2.5	36	
4	高砂錦	"	90	23	17	15	88	79	30	2.0	38	
5	女郎花	"	101	24	10	10	100	90	32	2.9	36	
6	陸羽132号	"	94	21	13	13	100	81	27	2.1	34	
7	陸羽20号	"	86	22	11	10	91	72	27	2.5	37	
8	愛媛1号	"	94	22	11	10	91	81	31	2.8	38	
9	若狭錦	"	84	21	12	11	92	83	28	2.4	37	
10	坊主玉川	"	94	25	13	12	92	79	24	2.5	37	
11	新石白	"	86	24	14	13	9.3	74	27	2.2	36	
12	若光辛	"	113	25	2	6	86	58	32	4.9	37	
13	綿内22号	"	98	24	10	10	100	82	27	2.9	37	
14	三八錦	"	112	20	10	9	90	98	32	3.0	33	
15	銀坊主	"	95	21	11	10	91	84	27	3.1	32	
16	穀錦	"	91	23	9	8	89	74	26	2.9	35	
17	穀錦坊主	"	121	24	7	7	100	83	28	4.6	34	
18	小笠錦	"	111	22	10	9	90	88	29	2.9	33	
19	郡益	"	111	23	9	9	100	86	26	3.2	30	
20	穀錦	"	106	21	9	9	100	67	31	3.3	47	
21	江山錦	"	98	22	9	9	100	70	31	3.1	34	
22	櫻一場一号	"	104	19	12	12	100	52	26	2.3	32	
23	改良神力	"	100	20	11	10	91	85	29	2.8	34	
										25	39	
										25	40	
24	伊勢錦22号	2	118	22	9	8	89	89	31	4.0	35	
25	愛知器昆好	"	86	20	16	15	94	93	32	2.2	35	
26	万代錦	"	108	21	9	9	100	86	30	2.9	35	
27	改良子本	"	116	22	9	9	100	88	29	3.2	33	
28	紅1号	"	112	21	9	8	89	90	30	3.4	33	
29	鳴江錦	"	106	21	9	8	89	86	28	3.5	33	
30	赤味	"	143	21	9	9	100	96	31	3.1	32	
31	清利	"	117	22	11	10	91	58	25	2.6	43	
32	中生不知火	"	114	21	10	9	90					
33	奈良中神1号	"	88	20	12	12	100	58	28	2.2	48	
34	三河錦	"	96	20	12	11	92	63	28	4.1	45	
35	大土不着	"	102	19	12	11	92	65	28	2.7	43	
36	神力	"	103	20	10	10	100	53	24	2.9	46	
37	102 江錦	"	118	21	9	9	100	58	27	3.5	46	
38	播磨錦	"	95	20	11	10	91	58	27	2.2	42	
39	大分赤鷹1号	"	103	20	10	10	100	61	28	2.7	47	
40	佐賀錦	"	119	21	10	9	90	66	28	2.9	42	
41	綿文56年	"	93	19	13	13	100	63	30	2.1	46	
42	大和錦	"	111	20	11	11	100	63	28	2.6	44	
43	倒木	"	95	20	12	12	100	62	29	2.5	42	
44	荒木	"	103	22	10	10	100	63	30	3.0	47	
45	綿内剛力	"	86	18	12	12	100	71	30	2.1	42	
46	追肥晚生	"	88	21	13	13	100	79	33	2.4	41	
47	約2号	"	108	20	9	9	100	68	29	2.9	43	
48	相德	"	102	20	13	13	100	68	29	2.3	42	
49	綿中坊主	"	132	24	11	10	91	71	29	2.8	41	

品種番号	品種名	試験年	播種量	穗長	茎数	穗数	有効茎率	一株全穂	一株穂重	平均穂重	平均穗重
50	新九郎	2	93cm	19cm	13	12	92%	66	29	2.6	44%
57	愛媛牛乳	"	101	21	13	13	100	65	30	2.4	46
52	山土坊主	"	98	21	15	15	100	71	31	2.1	43
53	新之郎	"	101	20	14	14	100	67	31	2.2	46
54	周山田出里1号	"	107	21	13	13	100	67	29	2.3	44
55	道海神力	"	95	20	13	12	92	62	28	2.3	45
56	天狗	"	103	21	13	12	92	84	31	2.6	43
57	須賀一東	"	96	21	16	15	94	64	29	2.0	45
58	曲玉	"	113	21	12	12	100	77	25	2.2	32
59	牛生	"	122	20	9	9	100	72	30	3.1	39
60	伊豫仙石3号	"	94	20	15	14	93	82	35	2.5	42
61	牛2	"	100	23	9	9	100	76	30	3.2	40
62	西宮48号	"	94	19	12	12	100	71	32	2.9	45
63	九郎8号	"	94	20	14	14	100	72	30	3.6	41
64	前深	"	81	24	11	10	91	72	27	2.7	37
65	赤穂神力	"	99	19	14	13	93	65	30	2.4	46
66	馬乘神力	"	97	21	12	11	92	64	29	1.5	45
67	櫻早生	"	113	22	13	13	100	50	21	3.8	43
68	福神	"	109	22	10	10	100	65	30	3.1	46
69	有開	"	103	24	9	8	89	69	26	3.3	38
70	新阪石穂	"	100	19	14	14	100	73	33	2.4	45
71	福壽1号	"	95	22	12	11	92	72	33	3.2	40
72	森田早生	"	78	20	19	18	95	74	27	1.6	36
73	新1号	"	98	22	11	10	91	84	32	3.1	38
74	上総コガレ	"	79	23	16	15	94	73	28	2.0	39

平均 42

75	奥野2号	1	83	21	10	9	90	81	30	3.1	37
76	北朝2号	"	104	23	10	10	100	77	35	3.6	46
77	大正1号	"	95	22	11	10	91	76	28	1.8	37
78	白玉1号	"	89	18	18	17	94	67	33	2.0	48
79	十四夏3号	"	107	23	9	9	100	100	33	3.6	33
80	白早生石1号	"	79	22	12	11	92	72	26	2.2	35
81	赤見山721号	"	81	24	10	9	90	66	24	2.3	36
82	長者穂	"	113	23	10	9	90	81	33	3.8	41
83	信助1号	"	88	22	14	13	93	77	30	2.1	39
84	愛媛神力	"	90	19	14	13	93	65	29	2.4	44
85	五七2	"	98	20	11	11	100	66	22	2.6	42
86	早生剛力	"	84	21	15	14	93	94	32	2.4	33
87	越前1号	"	94	24	9	8	89	69	28	3.4	40
88	銀葉1号	"	100	25	12	11	92	77	29	2.7	38
89	改良慶島	"	87	22	11	10	91	81	28	2.7	35
90	甲坊主1号	"	90	25	10	10	100	72	24	2.2	33
91	園山	"	101	26	8	8	100	65	25	3.6	38
92	仁17	"	84	19	18	16	89	72	26	2.6	37
93	一人娘	"	66	18	15	14	93	81	31	2.0	38
94	改良大球	"	96	21	11	10	91	91	32	3.0	35
95	中生神力4号	"	100	21	14	14	100	72	33	2.3	45
96	改良敦2号	"	100	24	10	9	90	29	28	3.0	35
97	新山田穂2号	"	106	21	10	10	100	99	32	3.4	32
98	三河牛郎	"	96	20	12	11	92	57	27	2.1	48
99	相模四1号	"	118	25	11	10	91	29	38	2.6	42
100	獅子不口食	"	93	22	11	10	91	91	26	1.7	36

41

品種番号	品種名	供試年	穂長	穗長	基數	穂粒	有効基粒	一株全重	一株穂重	平均穂重	穂重歩合
101	僕 160号	1	76	20	15	14	93%	21	30	11.7	42%
102	興 告選	1	104	23	10	10	100	81	34	3.3	42
103	伊豫相模1号	1	101	21	15	14	93	65	26	2.0	40
104	伊豫仙石1号	1	110	24	10	8	80	72	30	3.4	42
105	袖力374号	1	102	22	16	15	94	70	32	2.4	46
106	中着1号	1	95	23	13	12	92	85	29	2.5	34
107	近江5号	1	97	22	14	12	86	73	26	2.4	35
108	不作不知崎75	1	99	19	13	12	92	96	33	2.5	34
109	柳木早生	1	103	25	9	8	89	67	26	2.7	38
110	五郎	1	117	22	12	10	83	75	30	2.7	41
111	木曾	1	115	21	11	10	91	80	31	3.4	39
112	庄兵工	1	113	22	15	14	93	88	34	2.4	39
113	仙石5号	1	100	21	13	12	92	75	31	2.3	41
114	早大内3号	1	99	20	14	12	86	93	32	2.5	34
115	女神力	1	74	20	17	16	93	78	32	2.3	41
116	仁和4本	1	76	21	16	15	93	62	28	1.7	46
117	仲好	1	93	21	16	16	100	66	31	2.1	47
118	滋賀陶取	1	102	21	11	11	100	72	35	2.9	45
119	黒捷	1	90	24	9	9	100	64	22	2.6	34
120	158号	1	110	21	11	10	91	73	33	3.2	46
121	神力22号	1	96	19	15	15	100	65	30	2.5	46
122	日出19号	1	107	22	11	10	91	62	28	2.6	46
123	舞23号	1	96	20	12	11	92	65	31	2.4	47
124	三室16号	1	99	20	11	10	91	65	30	2.6	42
125	義光寺	1	109	22	14	13	93	72	31	2.3	40
										43	

126	朝 鮎	1	84	21	10	10	100	70	26	2.4	38
127	中生霞2号	1	89	24	10	10	100	67	25	2.5	37
128	尾	1	101	24	10	9	90	81	33	3.8	41
129	尾	1	93	22	9	9	100	80	26	3.4	33
130	福山	1	94	20	11	10	91	59	28	2.8	48
131	早生霞2号	1	79	20	7	6	86	55	18	2.8	34
132	豊1号	1	84	24	9	8	89	66	32	3.7	48
133	豊3号	1	87	22	11	11	100	72	28	2.4	38
134	早生大豊1号	1	87	24	9	9	100	76	32	2.8	41
135	早生女神力1号	1	78	21	12	11	92	70	25	2.3	36
136	九内1号	1	82	19	11	11	100	63	27	2.4	44
137	丹波中稻	1	87	20	11	11	100	83	28	2.5	34
138	日昇131号	1	96	20	12	12	100	73	33	3.0	45
139	豊穂1号	1	94	21	11	10	91	75	28	2.5	38
140	畿内早22号	1	74	22	10	19	90	67	24	1.5	36
141	赤玉	1	90	18	14	13	93	67	29	2.4	43
142	富士	1	93	21	14	13	93	73	36	2.6	43
143	二保	1	94	20	16	15	94	78	34	2.2	44
144	丸太1号	1	92	23	11	11	100	82	33	3.0	39
145	武藏	1	84	20	12	16	94	91	29	1.7	32

標準品種早神23号 (14区)

	穂長	穗長	一株全重	一株穂重	平均穂重	穂重歩合
平均	86	21	63	30	2.3	48
W%O	3.2	2.9	10.0	10.0	13.0	3.0

(3) 特性調查

品種番号	品種名	株高	葉形	葉色	葉質	葉緣	葉面	葉柄	花序形態	花序長短	花被片數	雄蕊數	雌蕊數	果實	果實大小	果皮性質	果肉性質	種子性質	根系性質
1	呂宋高粱	132	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
2	呂宋高粱	20	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
3	呂宋高粱	22	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
4	呂宋高粱	24	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
5	呂宋高粱	26	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
6	呂宋高粱	28	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
7	呂宋高粱	30	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
8	呂宋高粱	32	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
9	呂宋高粱	34	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
10	呂宋高粱	36	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
11	呂宋高粱	38	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
12	呂宋高粱	40	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
13	呂宋高粱	42	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
14	呂宋高粱	44	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
15	呂宋高粱	46	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
16	呂宋高粱	48	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
17	呂宋高粱	50	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
18	呂宋高粱	52	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
19	呂宋高粱	54	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
20	呂宋高粱	56	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
21	呂宋高粱	58	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
22	呂宋高粱	60	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	
23	呂宋高粱	62	披針形	綠色	厚	鋸齒狀	無毛	無毛	穗狀花序	中等	5	6	1	圓柱形	中等	無毛	少	少	

成績表 [VI] 耐病性交配用品種選定試驗 昭和三年度

西區多肥栽培 園場觀察及生育調查

品種番号	品種名	出種期	始出種期	穗滿期	倒伏	稻熱病	稈長	穗長	甚數	穗數	備考
予1	黑大卸	8.12	8.15	8.17	甚		116	25	11	10	
"2	墨苔	8.5	8.12	8.15	"		101	21	11	9	
"3	黑苔	8.10	8.16	8.17	"		114	24	10	9	
"4	黑色	8.6	8.16	8.18	"		108	24	12	11	
"5	冷早	8.25	8.1	8.7	"		99	22	13	11	
"6	早年	8.4	8.11	8.12	"		104	21	14	11	
"7	早年	8.4	8.11	8.12	"		101	19	13	11	
"8	綠	7.30	8.6	8.12	"		86	23	15	14	
"9	久	8.1	8.4	8.6	"	少	89	20	14	12	
"10	多夕	8.7	8.12	8.13	"		102	23	12	11	
"11	甲山	8.13	8.15	8.17	"		108	22	13	11	
"12	黑猪	8.4	8.10	8.12	"		101	22	13	11	
"13	豚	8.21	8.24	8.25	"	少	107	24	19	15	
"14	鴉	9.1	9.3	9.4	"		118	22	20	18	
"15	七月	8.22	8.25	8.29	"		102	21	14	11	
"17	月	8.11	8.15	8.17	"		121	23	13	12	
"18	嘉	8.7	8.14	8.16	"		105	22	14	13	
"19	鄭	8.12	8.15	8.16	"		105	25	13	12	
"20	大葉	8.7	8.13	8.15	"		102	23	16	14	
"21	毛	8.15	8.18	8.20	"		110	24	13	11	
"22	麥	8.17	8.19	8.20	"		108	25	13	11	

吸 51

吸 52

予23	大卸	8.11	8.13	8.18	甚		100	22	11	10	
"25	黃	8.9	8.13	8.16	"		119	23	15	14	
"26	早	8.21	8.28	8.30	"		126	23	11	10	
"27	凌	8.7	8.12	8.14	"		106	21	16	15	
"28	白	8.6	8.11	8.13	"		106	22	15	13	
"29	黃	8.6	8.10	8.13	"		92	21	10	9	
"30	鷺	8.5	8.11	8.12	"	少	104	22	13	12	
"31	龍	8.4	8.10	8.12	"	少	104	22	11	10	
"32	佳上	8.22	8.27	8.29	"						
"35	六	8.10	8.13	8.15	"		108	22	11	10	
"36	元山	8.12	8.16	8.18	"		94	24	16	14	
"37	廣	8.5	8.12	8.13	"		112	24	13	12	
"38	之	8.13	8.17	8.19	"		105	23	15	14	
"39	雜	8.12	8.13	8.15	"		82	20	16	14	
"40	巨	8.12	8.13	8.15	"		86	23	21	20	
"41	山多	8.17	8.20	8.23	"		106	24	12	11	
"42	タイコル	8.15	8.18	8.19	"		120	25	11	10	
"43	吉	8.20	8.24	8.26	"		109	24	14	13	
"44	斗沖	8.4	8.9	8.14	"		101	22	11	11	
"45	牛頭	8.20	8.22	8.23	"		114	27	13	12	
"46	毛	8.30	9.1	9.3	"		128	21	11	10	
"47	白	8.16	8.18	8.20	"		120	26	12	11	
"48	大圓	8.15	8.18	8.19	"		123	24	9	8	
"49	褲	8.12	8.14	8.15	"		112	25	13	12	
"57	多夕	8.15	8.17	8.19	"		109	24	18	17	
"52	玉	8.21	8.27	8.29	"		124	21	13	12	

品種號	品種名	出穂期	抽穗期	倒伏	稻熱病	稈長	穗長	莖數	穗數	備考
予53	老人稻	8.8	8.13	8.15	甚	107	23	16	14	
54	三穗稻	8.25	8.28	8.29	少	122	19	12	11	
55	白京稻	8.9	8.13	8.15	少	102	24	16	15	
56	老山稻	8.21	8.1	8.5	少	112	21	13	12	
57	黑風稻	8.21	8.25	8.26	少	109	26	9	9	
58	白京稻	8.11	8.13	8.14	少	107	23	14	14	
59	多夕稻	8.21	8.23	8.25	少	119	21	11	11	
60	白將軍	8.31	9.1	9.3	少	140	22	10	10	
61	苟明	8.13	9.1	9.2	少	122	21	12	10	
62	豆號	8.9	8.12	8.14	少	120	25	12	11	
63	刻季	8.20	8.21	8.22	多	108	24	12	11	
64	老人稻	8.19	8.21	8.22	甚	120	26	13	12	
65	走道同	8.18	8.20	8.21	少	122	27	15	13	
66	龍川稻	8.7	8.12	8.13	少	114	24	16	14	
67	米粗	8.22	8.25	8.26	少	107	22	14	12	
68	甘	8.20	8.22	8.23	無	102	24	12	11	
70	多	8.3	8.18	8.10	甚	113	23	12	11	
71	東稻	8.24	8.26	8.28	少	106	21	18	16	
72	當	8.11	8.14	8.16	少	108	21	17	15	
73	早丁稻	8.1	8.4	8.6	少	102	21	18	16	
75	綠立稻	8.9	8.14	8.15	少	106	25	13	12	
76	真粗	8.16	8.19	8.27	少	113	25	15	14	
77	千九四八	8.6	8.10	8.12	少	98	24	13	12	
78	7.16	8.17	8.19	少	120	21	15	14		
79	東稻	8.27	8.29	8.30	少	130	20	12	12	

收支 53

收支 54

380	大吊稻	8.11	8.14	8.18	甚	110	22	13	12	
81	稻(糯)	8.16	8.18	8.20	少	116	26	14	13	
83	大東稻	8.23	8.25	8.26	少	119	24	12	11	
84	老人稻	8.21	8.27	8.28	少	115	25	11	10	
85	九龍粗	8.15	8.20	8.21	少	122	29	11	11	
86	岱2芒	8.12	8.22	8.24	少	123	24	14	13	
87	紅桃粗	8.31	9.2	9.4	少	119	19	14	13	
88	タイコル	8.12	8.19	8.20	少	120	25	15	13	
89	隣不知稻	8.28	8.30	8.31	少	119	22	18	15	
91	此佳稻	8.26	8.29	8.31	少	107	25	15	13	
92	倭稻	8.2	9.5	9.6	少	137	27	15	12	
93	老人稻	8.27	8.29	8.30	少	124	21	13	12	
94	白稻	8.29	9.1	9.2	少	134	21	16	14	
95	呂西芒	8.25	8.29	8.30	少	121	22	17	15	
97	倭稻	8.29	8.31	9.1	少	128	21	11	11	
98	正清	8.31	9.1	9.2	少	142	22	11	9	
99	蕨稻	8.29	8.30	8.1	少	119	20	13	11	
100	粘稻	8.28	7.31	8.3	少	120	20	17	16	
101	粘粗	8.15	8.17	8.18	少	113	24	17	16	
102	草別稻	7.12	7.13	7.21	少	77	19	19	16	
103	秋稻	8.18	8.20	8.21	多	100	25	14	14	
104	白穀稻	8.11	8.13	8.15	少	114	26	14	13	
105	早打粗	8.17	8.19	8.20	少	123	27	13	8	
106	三山夕	7.19	7.28	8.13	甚	110	23			
107	蜜連	8.1	8.4	8.6	少	104	22	16	14	
108	白毛粗	8.9	8.13	8.14	少	101	23	11	10	

品種號	品種名	播種期	穗熟期	倒伏	優	稻熱病	稈長	穗長	莖數	穗數	備	考
109	間島	8.3	8.12	2.14	甚		112	22	16	14		
110	玉京粗	8.7	8.11	8.13	"		115	19				
111	龍編	8.7	8.11	8.14	少		115	23	15	14		
112	旱稻純系	8.9	8.12	8.14	中		103	21	18	17		
113	正東粗	8.15	8.17	8.18	少		100	25	12	12		
114	東山粗	8.14	8.18	8.22	少		94	24	15	14		
115	愛達	8.11	8.15	8.17	甚		115	22	13	13		
116	麥粗	8.12	8.15	8.16	"		109	23	14	14		
117	平壤壞	8.10	8.14	8.16	"		103	23	12	12		
118	睛黑粗	8.30	8.31	9.2	多		128	23	11	11		
119	黑粗	8.10	8.14	8.16	甚		123	24	12	12		
120	南海粗	8.11	8.14	8.15	少		111	25	13	12		
121	海粗	8.15	8.16	8.17	少		125	25	15	14		
122	大豆卸粗	8.13	8.16	8.18	多		107	23	8	8		
123	豆風粗	8.15	8.17	8.18	少		107	29	7	7		
124	風西稻	8.11	8.14	8.15	中		93	21	11	11		
125	白川	8.13	8.15	8.16	少	少	95	24	7	7		
126	白稻	8.14	8.16	8.17	多	少	105	23	7	7		
127	綠豆稻	8.15	8.18	8.19	少	少	105	22	8	8		
128	中稻粗	8.14	8.16	8.17	多		99	24	8	8		
129	池粗	8.12	8.14	8.15	少		97	21	8	8		
130	大骨稻	8.15	8.18	8.20	甚		111	24	7	6		
131	次稻	8.17	8.19	8.20	少		116	25	8	8		
132	多々粗	8.14	8.16	8.17	少		105	23	11	10		
133	光粗	8.19	8.21	8.22	甚		114	25	7	6		

四支 55

品種號	品種名	播種期	穗熟期	倒伏	優	稻熱病	稈長	穗長	莖數	穗數	備	考
134	老人稻	8.14	8.16	8.19	甚		104	21	7	7		
135	趙同知	8.20	8.21	8.23	少		109	23	8	7		
136	完全粗	8.24	8.25	8.26	無		118	24	7	7		
137	旭	8.6	9.7	9.8	少		91	19	12	11		
138	咸	9.5	9.6	9.7	少		108	22	10	10		
139	万作	9.2	9.3	9.4	少		115	22	9	9		
140	申村	9.2	9.3	9.4	少		118	22	10	10		
141	嘉義晚2号	9.10	9.11	9.13	少		92	23	8	7		
142	台中特2号	9.8	9.10	9.11	少		91	20	14	13		
143	清油	8.22	8.26	8.28	甚		118	21	12	12		
144	花螺	8.23	8.26	8.28	少		134	23	9	9		
145	鳥穀	8.27	9.1	9.4	少		128	22	13	12		
146	岸仔	不收穀										
147	稻穀	8.30	9.1	9.2	少		120	22	13	12		
148	林州	8.25	8.26	8.27	中		102	24	12	11		
149	下縣	不收穀										
150	格仔	不收穀										
151	鳥占	8.26	8.30	8.31	中		116	21	16	14		
152	嘉慶花螺	8.22	8.23	8.24	甚		122	22	9	9		
153	東聯	8.31	9.3	9.4	少		131	26	9	9		
154	鶯耳	不收穀										
155	米穀	不收穀										
156	竹絲衣	9.5	9.8	9.9	多		119	23	15	14		
157	9324ベラルベー	8.14	8.16	8.17	無		90	24	9	9		
158	白京粗	8.9	8.13	8.14	無		92	22	9	9		

四支 56

昭和參年氣象表

觀測所 稲葉郡加納町